

Aus der Frauenklinik der Universität Bonn.

Derz. Direktor: Geh.-Rat Prof. Dr. v. Franqué †.

Der Einfluß gynäkologischer Operationen auf die Menstruation.

Inaugural-Dissertation

zur

Erlangung der Doktorwürde

der

H o h e n M e d i z i n i s c h e n F a k u l t ä t

der

Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität

zu Bonn.

Vorgelegt am 24. Mai 1937

von

Kurt Stern

aus Bonn.

Gedruckt mit Genehmigung
der Hohen Medizinischen Fakultät der Universität Bonn.

Referent: Prof. Dr. Rupp.

Korreferent: Prof. Dr. Siebke.



Meinen Eltern.

Die Einwirkung physischer und psychischer Traumen auf die Menstruation ist schon seit längerer Zeit Gegenstand medizinischer Veröffentlichungen. Meine Aufgabe ist es, an Hand der Krankenberichte der Bonner Universitäts-Frauenklinik den Einfluß gynäkologischer Operationen auf die Menstruation zu ermitteln. Ich habe aus den Jahren 1933, 1934 und aus dem 1. Vierteljahr des Jahres 1935 283 Fälle zusammengestellt.

Dabei bin ich so vorgegangen, daß ich als erstes die normal eingetretene Menstruation, als zweites die zu früh eingetretene und als drittes die ausgebliebene Menstruation in zahlenmäßiger Reihenfolge in gleicher Weise jedesmal zusammengestellt habe. Daraufhin habe ich zu ermitteln versucht, ob nach der Art des operativen Eingriffes sowie auch in Bezug auf den Zeitpunkt im Intervall eine unterschiedliche Beeinflussung festzustellen war.

Lfd. №	Krankenblatt	Beginn und Art der Menstruation	Alter und Zahl der Partus	vorletzte Periode	letzte Periode
1	4/1932	14 J., 28 T. 4 Tg., seit 3 Mon. 25 Tg.	35 J., 2 P.	21.-25.11.31	14.-18.12.31
2	143/32	12 J., 28 Tg. 5 Tg.	41 J., 3 P.	19.-24.12.32	20.-25.1.32
3	355/32	15 J., 28 T., 4-6 Tg.	38 J., 5 P.		30.3.-3.4.32
4	527/32	15 J., 28 Tg. 4-5 Tg.	35 J., 1 P.	4 Wch. früher	27.-31.5.32
5	703/32	15 J., 28 Tg. 4 Tg.	36 J.	Mitte Juni	14.-18.7.32
6	750/32	16 J., 2-4 Wch. 3-6 Tg.	40 J., 3 P.	4.-9.7.	2.-8.8.32
7	777/32	13 J., 6-8 Wch. 3-8 Tg.	25 J., 3 P.	23.6.-1.7.	19.-6.8.32
8	818/32	13 J., 28 Tg. 5-7 Tg.	36 J., 1 P.	14.-19.7.	16.-21.8.32
9	1029/32	15 J., 28 Tg. 3-4 Tg. zuletzt 3 Wch -Zyklus	38 J., 1 P.	8.-12.10.	29.10.-6.11.32
10	1165/32	13 J., 24-25 Tg. 4-5 Tg.	24 J., 1 P.	18.-23.11.	11.-14.12.32
11	50/33	12 J., 28 Tg. 4-5 Tg.	29 J., 1 P.	4 Wch früher	8.-12.1.33
12	57/33	16 J., 28 Tg. 2-3 Tg.	28 J., 1 P.	10.-16.12.32	31.12.-8.1.33
13	63/33	18 J., 28 Tg. 4-5 Tg.	26 J., 1 P.	26.-30.12.32	23.-27.4.
14	74/33	15 J., 28 Tg. 3 Tg.	17 J.	2-4 Wochen früher	28.12.-2.1.33
15	444/33	16 J., 28 Tg. 2-3 Tg.	27 J., 1 P.	3 Wch. vorher	23.-27.4.
16	559/33	14 J., 26 Tg. 2-3 Tg.	44 J., 4 P.	4 Wch. vorher	20.-22.5.
17	649/33	13 J., 28 Tg. 2-4 Tg.	41 J., 2 P.	4 Wch. vorher	15.-'9.6.
18	762/33	16 J., 28 Tg. 4-5 Tg.	41 J., 2 P.	Anfang Mai	Anfang Juni
19	1254/33	15 J., 28 Tg. 3-4 Tg.	23 J., 1 P.	4 Wch vorher	28.11.-1.12.
20	1115/33	15 J., 28 Tg. 3-4 Tg.	26 J., 1 P.	4 Wch. vorher	17.-20.10.
21	924/33	16 J., 4-5 Wch. 2 Tg.	42 J., 2 P.	29.-31.7.	17.-19.8.

Diagnose	Art und Datum der Operation	Eintritt der normalen Periode	Entlassung
Follikelciste links	Lap. Excisio 5. 1. 32	6.-9. 1. 32	22. 1. 32
Ovarcyste r.	Keil-Excisio 15. 2. 32	17.-19. 2. 32	3. 3. 32
Desc. vag. dupl. Rectocele	Dolérís Colpor 23. 4. 32	24.-27. 4. 32	19. 5. 32
Desc. vag. dupl. Retrofl. ut.	Dolérís Colpor. 11, 6. 32	24.-27. 6. 32	28. 6. 32
Dermoidcyste r., kl. cyst. Deg. Ov. links	Adnexentfern. r. Teilresekt. ov. lks. App. ect. 6. 8. 32	8.-13. 8. 32	24. 8. 32
Desc. vag. dupl.	Colpor. dupl. 22. 8. 32	29.8.-3.9.32	16. 9. 32
Desc. vag. dupl.	Colp. dupl. 28. 8. 36	13.-16. 9. 32	22. 9. 32
Verdacht auf Extrauterin- grav.	Appendectomie 7. 9. 32	11.-14. 9. 32	7. 10. 32
Salpingitis chron.	Adnexentf. lks. 15. 11. 32	17.-20. 11. 32	+ 23. 11. 32
Corp. lut. Cyste	Ovar- u. Tube Entf. r. 7. 1. 33	8.-11. 1. 33 28 Tg Cycl.	1. 2. 33
Retrofl. ut. Desc. vag. dupl.	Colp. dupl. portio Amp. Alex. Adam 19. 1. 33	3.-5. 2. 33	6. 2. 33
Rect. Dammfistel Desc. vag. ant.	Plastik 12. 5. 36	27. 1.-30. 1.	18. 2. 33
Dammriß tot.	Scheidenplastik Portio- Amput. 25. 1.	22.-24. 5.	31. 5.
Dermoidcyste r. Corp. lut. Cyste lks.	Ovar tumor r. ent. Keilres. ovar. lks. App. Ectomie 24. 1.	26. 1.	19. 2.
Tot. Dammriß	Plastik 12. 5.	22.-24. 5.	31. 2.
Dermoidcyste lks.	Adnexentf. lks., Keilresekt. d. r. Ovars 14. 6.	17. 6.-20. 6	
Desc. vag. dupl.	Plastik, Abrasio 27. 6.	12.-13. 7.	20. 7.
Douglas Absz.	Spaltung d. hint. Scheiden- gewölbes 28. 7.	3.-9. 8.	16. 8.
Erosio glandularis	Port.-Amp. Abrasio 21. 12.	25.-27. 12.	2. 1. 34
Retroflex. ut. fixata	Dolérís, App. Ectomie 10. 11.	12.-14. 11.	24. 11.
Ovarcyste lks.	Salpingoophorectom lks. 11. 9.	12. 9.	30. 9.

Lfd. Nr.	Krankenblatt	Beginn und Art der Menstruation	Alter und Zahl der Partus	vorletzte Periode	letzte Periode
22	941/33	18 J., 28 Tg. 8 Tg.	31 J., 1 P.	4Wch.vorher	30.8.-6.9.
23	17/34	10½ J., 28 Tg. 5-6 Tg.	40 J.	Mitte Nov.33	12.-18.12.33
24	156/34	14 J., 3 T. 3-4 Tg.	47 J., 3 P.	3 Wch.vorher	14 -17. 1.
25	207/34	13 J., 28 / 6	39 J., 3 P.	28 Tg.vorher	30. 1.-5. 2.
26	227/34	12 J., 28 / 4-5	25 J.		30. 1 -3. 2.
27	763/34	12 J., 28 / 1-2	33 J., 1 P.	9.-10. 2.	7.-8.3. 3.4. ?
28	501/34	14 J., 28 / 8	34 J.		6.-9. 4.
29	517/34	16 J., 28 / 8	25 J.	14.-22. 12.33 11. 1. 34	Febr., März normal
30	663/34	18 J., 28 / 8	37 J.		Mitte Mai
31	666/34	13 J., 28 / 3-4	18 J.	17.-20. 4.	16.-19 5.
32	697/34	15 J., 28 / 6-8	29 J.	4Wch. früher	27.5.-2. 6.
33	1157/34	11½ J., 28 / 5-8	34 J., 3 P.	8.-15. 8.	15.-29. 9.
34	1195/34	13 J., 28 / 3	28 J., 1 P.	6.-9. 7	22.-24. 9.
35	1223/34	17 J., 28 / 3	27 J.	7.-9. 10.	21.-23. 10.
36	1273/34	12 J., 28 / 3-4	32 J.	10.-13. 9.	8.-11. 10.
37	823/34	28 / 3	29 J.	4Wch.vorher	11.-15. 7.
38	889/34	13 J., 28 / 3	6 P.	11.-14. 6.	16.-19. 7.
39	894/34	14 J., 3-5 3-4	37 J., 2 P.	6Wch.vorher	30.7.-2. 8.
40	897/34	11½ J., 28 / 3	46 J., 10 P.	8Wch.vorher	13.-17. 7.
41	920/34	14 J., 28 / 5-6	22 J.	25.-27. 6.	18.-21. 7.
42	997/34	19 J., 28 / 8	23 J., 1 P.	15.-22. 7.	26.-27. 8.
43	1051/34	15 J., 28 / 8	34 J., 1 P.	4Wch vorher	26.-27. 8.

Diagnose	Art und Datum der Operation	Eintritt der normalen Periode	Entlassung
Ovarcyste lks. u. r.	Salpingoophorectom. lks. u. r. 18. 9.	28. 9.	4. 10.
Uterusmyom, Appendicitis	Entf. d. Myoms, App.-Ectomie 5. 1. 34	7.-10. 1. 34	24. 1. 34
Dammhaematom nach früherer Plastik	hint. Plastik, Entf. d. Haematoms 9. 2.	12. 2.	2. 3. 34
Blasenscheidenfistel und Scheidencysten	vag. Entf. d. Cysten 17. 2.	28. 2.-2. 3. 26.-29. 3.	10. 4. 34
Retroflex. ut. mob.	Doléris 24. 2.	24.-28. 2.	18. 3. 34
Prolaps d. Vaginalwand	Plastik 19. 4.	2. 5.	9. 5. 34.
angeborener Schwachsinn	Keilresect. 23. 4.	1.-3. 5.	7. 5. 34
Retroflex ut., kl.-cyst. Degener. d. Ovarien	Doléris, App. Ect. Keilresect. d. Ov. lks. u. r. 27. 4.	29. 4.	22. 5. 34
Cyst. Degen. d. Ovar. lks. u. r., Schizophr.	Keilexc. beider Tuben „ aus beid. Ovar. 12. 6.	13.-14. 6.	28. 6. 34
Angeb. Schwachsinn	Entf. beider Tuben	13.-14. 6.	6. 7. 34
Erosio port.	Schroeder-Emmet 22. 6.	25. 6.	27. 6.
Angeb. Schwachsinn man. Depr.	Keilexcis. 4. 10.	12.-15. 10.	15. 10.
Schizophr.	Keilexc. 12. 10.	17.-19. 10.	22. 10.
Angeb. Schwachsinn	Entf. d. lk. Adn. Sterilis. 13. 11.	15.-19. 11.	26. 11. 34
Angeb. Schwachsinn	Keilexcis. 3. 11.	5.-7. 11.	19. 11. 34
Schwachsinn, Schizophren.	Keilexc. 31. 7.	6.-11. 8. 2.-8. 9.	29. 9. 34
Desc. vag. dupl.	Plastik, Port. Amp. 6. 8.	11.-13. 8.	21. 8. 34
Desc. vak. dupl.	Plastik, Port. Amp. 6. 8.	26.-27. 8.	15. 9. 34
Man. depr.	Keilexc. 7. 8.	9.-12. 8.	18. 8. 34
Epilepsie	Keilexc. 13. 8.	14.-16. 8.	25. 8. 34
Angeb. Schwachsinn	Keilexc. 14. 9.	21.-25. 9.	25. 9. 34
Angeb. Schwachsinn	Keilexc. d. l. Tube. Adn. r. exstirpiert 1. 9.	4.-6. 9.	12. 9. 34

Lfd. Nr.	Krankenblatt	Beginn und Art der Menstruation	Alter und Zahl der Partus	vorletzte Periode	letzte Periode
44	1340/34	12 J., 28 Tg. 6 Tg.	34 J.	3.-7. 10.	1.-4. 11.
45	1389/34	18 J., 28 / 6	27 J.	1.-7. 10.	29. 10.-4. 11.
46	1424/34	14 J., 25 / 3-4	41 J., 1 P.	3½ W. vorher	19.-23. 11.
47	1445/34	17 J., 28 / 4-5	20 J.	4 Wch. vorher	16.-20. 11.
48	1489/34	11 J., 20-28 6-10	21 J.		23. 11.-2. 12.
49	1493/34	19 J., 28 / 3-4	30 J., 2 P.	4 Wch. vorher	12.-15. 12.
50	85/35	14 J., 28 / 3-4	34 J.	4 Wch. früher	23.-26. 12. 34
51	264/35	14 J., 28 / 3-4	36 J., 1 P.	4 Wch. früher	5.-8. 2.
52	208/35	14 J., 5-8 8	25 J.	6 Wch. vorher	11.-19. 1.
53	308/35	19 J., unregelm.	23 J.		15.-18. 2.
54	163/35	12 J., 28 / 3-4		4 Wch. vorher	8.-11. 1.
55	354/35	14 J., 28 / 4-8	26 J., 3 P.	26. 1.-1. 2.	27. 2.-4. 3.
56	1027/34	12 J., 28 / 3-4	30 J.	vor 7 Wch.	14. 8.
57	308/33	15 J., 3-3½ Wch. 3	35 J.		22.-25. 3.
58	940/34	16 J., 28 / 3	32 J., 2 P.	4 Wch. vorher	Ende Juli
59	356/33	18 J., 28 / 5-6	30 J., 1 P.	22.-28. 2.	20.-26. 3. (16. 4. ?)
60	739/34	28 / 3-5	21 J.	4 Wch. vorher	1.-5. 6.
61	812/34	15 J., 28 / 8	17 J.	4 Wch. vorher	18. 6. ?
62	799/34	14 J., 28 / 4	36 J.	4 Wch. vorher	9.-13. 6.
63	1063/34	13 J., 28 / 5-6	26 J.	13.-17. 7.	10.-14. 8.

Diagnose	Art und Datum der Operation	Eintritt der normalen Periode	Entlassung
Schizophrenie	Keilexc. 17. 11.	27.-29. 11.	29. 11. 34
Angeb. Schwachsinn	Keilexc. 23. 11.	25.-28. 11.	5. 12. 34
Retrofl. uteri	Doléris 30. 11.	14. 12.	14. 12. 34
Epilepsie	Keilexc. 6. 12.	14.-16. 12.	17. 12. 34
Schwachsinn	Keilexc. 19. 12.	20.-23. 12.	2. 1. 35
Schizophr.	Keilexc. 20. 12.	6. 1. 35	9. 1. 35
Schizophr.	Keilexc. 18. 1.	18.-25. 1. 35	29. 1. 35
Angeb. Schwachsinn	Keilexc. 26. 2.	3.-6. 3.	13. 3. 35
Epilepsie	Keilexc. 13. 2.	16.-20. 2.	26. 2. 35
Veitstanz	Keilexc. 7. 3.	15.-17. 3.	19. 3. 35
Angeb. Schwachsinn	Exstirp. d. r. Tube, Keilexc. d. lk. Tube 4. 2.	6.-9. 2.	15. 2. 35
Erosio gland. Ectrop. port.	Portio Amp.	28. 3.	29. 3. 34
Schizophr.	Keilexc. 5. 9.	8.-10. 9.	17. 9. 34
Dermoidcyste lks.	Cyste u. lk. Tube entf. App.-Ectomie 3. 4.	11.-14. 4.	19. 4. 33
Schizophrenie	Keilexc. 5. 9.	23.-27. 8.	30. 8. 34
Retroflex. ut. mob. Desc. vag. dupl.	Doléris, Scheidenplastik 18. 4.	19.-26. 4.	13. 5. 33
Schizophrenie	Keilexc.	4.-6. 7.	12. 7. 34
man. depr.	Keilexc. 19. 7.	21.-26. 7.	2. 8. 34
Myom und Epilepsie	Entf. d. lk. Adn., Keil-resect. d. r. Tube, Exc. d. Myoms 7. 7.	9.-14., 17. 7.	6. 8. 34
Epilepsie	Keilexc. 13. 9.	14.-15. 9.	24. 9. 34

Lfd. №	Krankenblatt	Beginn und Art der Menstruation	Alter und Zahl der Partus	vorletzte Periode	letzte Periode
1	113/32	17 J., 4 Tg. / 4 Tg.	29 J., 1 P.	20.-26. 12.	16.-22. 1.
2	142/32	14 J., 5 / 3-6	30 J., 5 P.	18.-22. 12.	23.-27. 1.
3	183/32	14 J., 4 / 3	41 J., 3 P.	13.-16. 1.	9.-12. 2.
4	197/32	16 J., / 4 / 3-4	34 J., 1 P.	16.-20. 1.	11.-15. 2.
5	217/32	14 J., 4 / 3-4	26 J., 2 P.	15.-17. 1.	15.-19. 2.
6	265/32	15 J., 3-3½ / 3-4	33 J., 1 P.	15.-18. 2.	8.-11. 3.
7	288/32	3-4 / 3-4	32 J., 1 P.	12.-15. 2.	5.-8. 3. 30. 3.-1. 4.
8	300/32	16 J., 4 / 4-5	45 J., 2 P.	3.-6. 4.	2.-5. 5.
9	338/32	11 J., 4 / 3-4	47 J., 3 P.	1.-4. 3.	30. 3.-4. 4.
10	391/32	17 J., 26 / 3-4	49 J., 4 P.	30. 3.-2. 4.	25.-29. 4.
11	392/33	19 J., 4 / 3-4	48 J., 2 P.	28. 3.-1. 4.	25.-30. 4.
12	515/32	16 J., 4 / 2-3	48 J., 7 P.	19.-21. 3.	19.-20. 5.
13	573/32	16 J., 4 / 5-6	24 J., 2 P.	15.-21. 5.	11. 17. 6.
14	603/32	14 J., 4 / 4-5	22 J.	28 Tg. früher	21.-25. 6.
15	654/32	15 J., 27 / 3-4	31 J.	18.-21. 6.	15.-18. 7.
16	716/32	15 J., 4 / 6-8	28 J., 4 P.		2.-12. 10.

Diagnose	Art und Datum der Operation	Menstr.p.Op. zu früh aufgetreten	Entlassung
Ovarcyste r.	Laparot. 5. 2.	7/8. 2. 5Tg. früher	19. 2. 32
Desc. vag. dupl.	Colpor. dupl. 17. 2.	22.-23. 2. 4 Tg. früher	29. 2. 32
Dermoideyste lks.	Exstirp. d. Dermois Tube lks. u. r. exst. Ovar r. resect, 24. 2.	26/27. 2. 10Tg. früher	16. 3. 32
Retroflex. ut. fix.	Ov. r. resect. Ov. lks. Tube lks. exstirp. App. ect. 29. 2.	1.-3. 3. 8Tg. früher	16. 3. 32
Desc. vag. dupl.	Portio-Plastik, Colp. dupl. 3. 3.	7.-11. 3. 19/20. 3. 7Tg. früher	27. 3. 32
Tot. Dammriß	Plastik 19. 3.	28/29. 3. 10Tg. früher	9. 4. 32
Retroflex. ut.	Doléris 15. 4.	17.-19. 4. 9Tg. früher b.4Wch.Cycl.	28. 4. 32
Desc. vag. dupl.	Colpor dupl. 23. 5.	26.-31. 5. 3Tg. früher	4. 6. 32
Retroflex. ut. fix.	Doléris 14. 4.	22.-26. 4. 4Tg. früher	28. 4. 32
Desc. vag. dupl.	Colp. dupl. 6. 5.	17.-20. 5. 5Tg. früher	25. 5. 32
Desc. vag. dupl.	Colp. dupl. 7. 5.	17.-23. 5. 5Tg. früher	25. 5. 32
Desc. vag. dupl.	Colp. dupl. Interpos 9. 6.	11.-17. 6. 4Tg. früher	27. 6. 32
Retroflex. ut. mob.	Doléris 30. 6.	2.-4. 7. 6Tg. früher 4Wch.Cycl.	15. 7. 32
Retroflex. ut. fix.	Doléris 9. 7.	11/12. 7. 7Tg. früher	20. 7. 32
Ut. Myom	Lapar. Enucleatio 25. 7.	27.-30. 7. 15Tg. früher	14. 8. 32
Retroflex. ut.	Doléris 21. 10.	25.-27. 10. 4Tg. früher	11. 11. 32

Lfd. Nr.	Krankenblatt	Beginn und Art der Menstruation	Alter und Zahl der Partus	vorletzte Periode	letzte Periode
17	720/32	13 J., 4 Tg. 8.Tg.	42 J., 6 P.	3.-10. 7.	1.-7. 8.
18	844/33	13 J., 4 / 4-5	32 J.	4.-8. 8.	3.-7. 9.
19	883/32	14 J., 4 / 5-6	38 J., 2 P.	3 Wch. früher	15.-22. 9.
20	903/32	18 J., 4 / 3	27 J., 3 P.	29. 8.-1. 9.	26.-29. 9.
21	905/32	17 J., 4 Wch.?	46 J., 4 P.	1.-6. 8.	30. 8.-6. 9.
22	988/32	17 J., 4 / 3-4	31 J., 2 P.	29. 9.-6. 10.	23.-30. 10.
23	1029/32	15 J., 4 / 3-4	38 J., 1 P.	8.-12. 10.	29.10.-6. 11.
24	1074/32	17 J., 4 / 8	43 J., 3 P.	15.-21. 10.	12.-19. 11.
25	1076/32	16 J., 3-4 / 3-4	33 J., 2 P.	16.-20. 10. 6.-10. 11.	29. 11. 28.-30. 12.
26	426/32	16 J., 4 / 8-10	46 J., 2 P.	19.-24. 4.	13.-17. 5.
27	53/33	13 J., 4 / 6-8	27 J., 2 P.	3.-6. 12.	31. 12.-3. 1.
28	224/33	17 J., 4 / 3	38 J., 2 P.	Anfang Feb.	1.-4. 3.
29	238/33	18 J., 4 / 5-6	29 J.	1.-7. 2.	1.-6. 3.
30	285/33	15 J., 4 / 2-3	27 J., 1 P.	4 Wch früher	21.-23. 3.
31	322/33	4 / 6-7	19 J., 1 P.	3 Wch. vorher	28. 2.-5. 3.
32	418/33	16 J., 4 / 4	38 J., 5 P.	24.-28. 3.	18.-22. 4.

Diagnose	Art und Datum der Operation	Menstr. p. Op zu früh eingetr.	Entlassung
Desc. vag. dupl. Elong. colli	Interpositio, Plastik Port. Amp. 12. 8.	17.-24. 8. 11Tg. früher	30. 8. 32
Adnexitis r.	Adn. r. entf. 17. 9.	19.-22. 9. 11Tg. früher	7. 10. 32
Desc. vag. dupl.	Plastik 29. 9.	9./10. 10. 3Tg. früher	18. 10. 32
Desc. vag. dupl. Ectrop. colli	Plastik, Port, Amp. 5. 10.	15.-19. 10 8Tg. früher	24. 10. 32
Ovar u. Periton. Ca.	Probelaop. 7. 10.	15Tg. früher 8.-10. 10. 10.-16. 11.	27. 10. 32
Douglas Absz.	Spaltung d. hint. Scheiden- gewölbes 4. 11.	7.-11. 12. 12Tg. früher	14. 12. 32
Salpingitis chron.	Adnex entf. lks. 15. 11.	17.-20. 11. 8Tg. früher 3Wch. Cycl. normal	23. 11. 32 gest
Prolaps. Elongatio colli, Cysto, Rectocele	Port. Plastik, Interpositio, Tub. Steril 1. 12.	4.-7. 12. 5Tg. früher	20. 12. 32
Desc. vag. dupl. Rectocele	Colp. dupl 4. 1. 33	12.-15. 1. 33 12Tg. früher 4Wch. Cycl.	22. 1. 33
Hydrosalpinx	Salpingo-Ophorect. r. 1. 7.	4Wch. Cycl 2.-10. 7. 4Tg. früher	17. 7. 32
Retroflex. ut.	Doléris, Keilresect. von Ovarcyste lks. 19. 1.	21./22. 1. 6Tg. früher	12. 2. 32
Desc. vag. dupl.	Plastik, 10. 3.	24.-25. 3. 4Tg. früher	26. 3. 33
Retroflex. ut. fixata	Doléris, 17. 3.	20.-23. 3. 8Tg. früher	1. 4. 33
Desc. vag. dupl. Retrofl. ut.	Doléris, Plastik, Port. Amp. 30. 3.	3.-13. 4. 14Tg. früher	29. 4. 33
Retroflex. ut. fix.	Doléris, Herniotom. App. Ectom. 15. 3. 34	19.-21. 3. 8Tg. früher	3. 4. 34
Desc. vag. dupl. Portio Erosio	Plastik, Portio Amp. 5. 5.	12.-15. 5. 3Tg. früher	24. 5. 33

Lfd. Nr.	Krankenblatt	Beginn und Art der Menstruation	Alter und Zahl der Partus	vorletzte Periode	letzte Periode
33	452/33	18 J., 4 Tg. 6-7 Tg.	30 J., 2P.	20.-26.4.	15.-19. 5.
34	579/33	14 J., 4 / 3—4	45 J., 6P.		5.-8. 4.
35	744/33	14 J., 4 / 4—5	33 J.	4 Wch. früher	9.-11. 7.
36	833/33	12 J., 4 / 3—4	27 J., 1P.	3 Wch. vorher	1.-7. 8.
37	1142/33	13 J., 4 / 5	36 J., 2P.	4 Wch. vorher	26.-10.-1. 11.
38	1161/33	14 J., 4 / 2—3	40 J., 7P.	26.-29.10.	20.-23. 11.
39	1195/33	17 J., 4 / 3—4	32 J.	4 Wch. vorher	11.-14. 10.
40	925/33	16 J., 4 / 3—5	35 J., 2P.	14 Tg. vorher	2.-4. 9.
41	958/33	14 J., 3 / 3	35 J., 2P.	22.-24. 9.	20.-22.
42	984/33	14 J., 4 / 3—5	33 J., 1P.	4 Wch. vorher	11.-15. 9.
43	988/33	16 J., 5 / 2	34 J., 2P.	5 Wch. vorher	26.-28. 8.
44	51/34	16 J., 4 / 3	36 J., 4P.	4 Wch. früher	1.-3. 1.
45	77/34	12 J., 4 / 3—4	31 J.,	4 Wch. vorher	5. 1.
46	92/34	16 J., 4 / 4—5	29 J., 2P.	18.-22. 12.	17.-22. 1.
47	116a/34	16 J., 4 / 3—4	24 J., 2P.	7.-11. 1.	4.-9. 2.
48	119/34	15 J., 4 / 4—5	43 J., 2P.	4 Wch. vorher	23.-27. 1.

Diagnose	Art und Datum der Operation	Menstr. p. Op. zu früh eingetr.	Entlassung
Retroflex. ut., Desc. vag.	Doléris, Plastik 23. 5.	2. 6., 9 Tg. früher	11. 6. 33
Dermoideyste lks.	Cyste u. Tube lks. entf. App. Ectom. 16. 6.	17.-25. 6. 8 Tg. früher	12. 7. 33
Hernia inquin.	Herniotom., Raffung d. ligam. rot. 27. 7.	31. 7. 5 Tg. früher	19. 8. 33
Erosio d. M. M. Lippe	Schröder-Emmet 18. 8.	4 Wch. Cycl. 25.-27. 8. 3 Tg. früher	1. 9. 33
Retroflex. ut. fix. chron. Adn. r.	Doléris, Adn. r. entf. 17. 11.	18.-23. 11. 4 Tg. früher	3. 12. 33
Desc. vag. dupl. Erosio port.	Plastik, Portio Amp. 1. 12.	7.-8. 12. 10 Tg. früher	22. 12. 33
Tubarabort lks.	Adn. lks. entf. 30. 11.	1.-3. 12. 3 Tg. früher	20. 12. 33
Desc. vag. dupl. Retroflex. ut.	Alex. Adam, Plastik 31. 10. 34	13.-16. 11. 3 Tg. früher	16. 11. 34
Retroflex. ut. Desc. vag. dupl.	Doléris, Plastik 9. 9.	11. 9. 18 Tg. früher	27. 9. 33
Desc. vag., Ectrop. port.	Plastik, Port. Amp. 30. 9.	3.-6. 10. 5 Tg. zu früh	17. 10. 33
Desc. vag., Retroflex. ut., Elong. colli; Bronchopneum.	Doléris, Plastik, Port. Amp. 30. 9	8.-10. 10. 24 Tg. früher	1. 11. 33
Erosio glandul. Retrofl. ut. Desc. vag. dupl.	Plastik, Vaginifix. d. Ut. Port. Amp. 19. 1.	24.-28. 1. 4 Tg. früher	10. 2. 34
Ovarcyste lks.	Cyste entf. 22. 1.	24.-28. 1. 8 Tg. früher	10. 2. 34
Desc. vag. dupl.	Plastik 31. 1.	8. 2. 5 Tg. früher	16. 2. 34
Retroflex. ut.	Doléris 23. 2.	26. 2.-1. 3. 5 Tg. früher 1.-4. 10. 24.-27. 10.	12. 3. 34
Peritiphlytis	App. Ect. 1. 2.	5.-7. 2. 14 Tg. früher	9. 2. 34 gest.

Lfd. №	Krankenblatt	Beginn und Art der Menstruation	Alter und Zahl der Partus	vorletzte Periode	letzte Periode
49	141/34	13 J., 3 Tg. 3-4 Tg.	39 J., 5P.	3Wch.vorher	27.-30. 1.
50	143/34	17 J., 4 / 2	33 J., 1P.	4Wch.vorher	23.-25. 1.
51	151/34	15 J., 4 / 8	29 J.	30. 12.-6. 1.	28. 1.-3. 2.
52	156a/34	16 J., 25 / 5	33 J., 2P.	26. 2.-3. 3.	25. 3.
53	465/34	3 / 3	30 J.	21.-23. 3.	8.-10. 4.
54	563/34	12 J., 4 / 3	33 J., 3P.	5.-8. 4.	3.-7. 5.
55	567/34	13 J., 4 / 8	27 J., 1P.	31. 3 -5. 4.	28. 4.-3. 5.
56	638/34	13 J., 4 / 3	24 J.,	4Wch. früher	8. 3.-11. 3.
57	665/34	15 J., 4 / 3—4	41 J., 5P.	4Wch. früher	28.-31. 5.
58	696/34	15 J., 4 / 3	29 J., 3P.	14 Tg. früher	1.-4. 6.
59	742/34	14 J., 4 / 6—8	39 J.,	4Wch. früher	15.-22. 6.
60	1155/34	12 J., 4 / 3		27.-29. 8.	25.-27. 9.
61	1193/34	16 J., 4 / 5—8	20 J.,	5.-10. 9.	2.-7. 10.
62	1213/34	13 J., 3 / 3—4	28 J.,	16.-19. 9.	6.-8. 10.
63	1221/34	15 J., 4 / 6—8	41 J., 1P.	11.-18. 9.	8.-13. 10.
64	1224/34	15 J., 4 / 4	25 J.,	2.-5. 9.	29. 9.-1. 10.

Diagnose	Art und Datum der Operation	Menstr. p. Op. zu früh eingetr.	Entlassung
Desc. vag.	Plastik, Port, Amp. 9. 2.	11/12/16/18. Febr., 5Tg. früher	20. 2. 34
Hydrosalpinx lks. u. r. Adn. Tumor lks., Cyster.	Tube r. lks. Ovar. lks. entf., Keilexc. aus d. r. Ovar 5. 2.	7. 2. 12Tg. früher	17. 2. 34
Retroflex. ut. subserös. Myom	Dolérís, Keilexc. einiger Myome 8. 2.	21. 2. 3Tg. früher	20. 2. 34
Desc. vag. dupl.	Plastik, 6. 4.	10.-14. 4. 11Tg. früher	26. 4. 34
Schizophren	Keilexc. 14. 4.	18. 4. 10Tg. früher	6. 5. 34
Epilepsie	Keilexc. 18. 5.	24./25. 5. 6Tg. früher	2. 6. 34
Dermoideyste lks. Idiotie	Adn. lks. entf., r. Tube Keilexc. 15. 5.	16.-18.5.9Tg. früher 3.9.34 25.1.35 Mens alle 14Tg.	28. 5. 34
Schizophr., chron. Appendicitis	Keilresect. beider Tuben u. aus d. r. Ovar. App. Ectom. 7. 6.	8.-10. 6. 15Tg. früher nach vorh. Cycl.	29. 6. 34
Retroflex. ut , Desc. vag , Erosio port.	Schröder-Emmet, Plastik 11. 6.	14.-16. 6. 10Tg. früher	24. 6. 34
Schizophren	Keilexc., Corp. lut. r. 22. 6.	23.-25. 6. 5Tg. früher	4. 7. 34
Angeb. Schwachsinn	Keilexc. Myom entf. 6. 7.	9.-16. 7. 3Tg. früher	19. 7. 34
Angeb. Schwachsinn	Keilexc. 5. 10.	8.-10. 10. 14Tg. früher	18. 10. 34
Angeb. Schwachsinn r. Övarcyste	Keilexc , Cyste gestichelt 12. 10.	15.-17. 10. 14Tg. früher	23. 10. 34
Schizophr	Keilexc., r, Adn. ext. 15. 10.	16.-19. 10. 10Tg. früher	26. 10. 34
Angeb. Schwachsinn	Keilexc. 18. 10.	24.-27. 10. 11Tg. früher 20. 11. ausg.	24. 11.
Angeb. Schwachsinn	Keilexc. 19. 10.	20.-22. 10. 6Tg. früher	30. 10. 34

Lfd. №	Krankenblatt	Beginn und Art der Menstruation	Alter und Zahl der Partus	vorletzte Periode	letzte Periode
65	1254/34	17 J., / 4 / 3 - 5	37 J.	19.-22. 9.	16.-19. 10.
66	1271/34	14 J., 4 / 6—7	39 J., 3P.	23.-28. 9.	21.-27. 10.
67	1272/34	15 J., 4 / 3	19 J.	24.-26. 9.	22.-24. 10.
68	1285/34	15 J., 4 / 3—7	30 J.,	17.-19. 8.	15.-17. 9. 12. 10. ?
69	822/34	4 Tg. / 3-4 Tg.	22 J., 1 P.	4Wch. früher	12.-15. 7.
70	832/34	15 J., 4 / 8	33 J.,	6.-13. 6.	2 -9. 7.
71	838/34	16 J., 4 / 3	30 J.,	4Wch früher	19.-22. 7.
72	839/34	18 J., 4 / 4	30 J.,	4Wch. früher	16.-20. 7.
73	841/34	16 J., 4 / 3—4	38 J., 2 P.	4Wch. früher	15.-17. 7.
74	915/34	15 J., 4 / 5	26 J.,	8Wch früher	29 7.-3. 8.
75	924/34	14 J., 4 / 8	27 J., 2 P.	24.6.-1. 7.	22.-30. 7.
76	941/34	14 J., 4 / 4	36 J., 1 P.	4Wch. vorher	10.-13. 8.
77	946/34	14½ J., 4 / 3—4	29 J.,	4Wch. vorher	5.-8. 8.
78	96 /34	16 J., 3½ / 4—4	37 J., 3P.	23.-26. 7.	15.-19. 8.
79	967/34	4 / 2—3	36 J.,	17.-19. 7.	10.-12. 8.
80	974/34	16 J., 4 / 3	23 J.,	3.-6. 7.	1.-3. 8.
81	988/34	15 J., 4 / 5—8	31 J.,	27.-30. 7.	22 -24. 8.

Diagnose	Art und Datum der Operation	Menstr.p.Op. zu früh eingetreten	Entlassung
Schizophrenie	Keilexc. 24. 10.	26.-10. 1. 11. 17 T. früher	3. 11. 34
Man. depr.	Keilexc. 26. 10.	5.-6. 11. 12 T. früher	6. 11. 34
Angeb. Schwachsinn	Keilexc. 7. 10.	1.-5. 11 17 Tg. früher	6. 11. 34
Schizophr.	Keilexc. 29. 10.	30. 10.-3. 11. 9 Tg. früher	8. 11. 34
Angeb. Schwachsinn	Keilexc. 20. 7.	22. 23. 26. 29. 30. 7. 17 Tg. früher	8. 8. 34
Adnexitis lks. r.	lk. Ovar, lk. u. r. Tube ext. 25. 7.	26./27. 7. 3 Tg. früher	10. 8. 34
Schizophr.	Keilexc. 27. 8.	1.-4. 8. 14 Tg. früher	8. 8. 34
Schizophr.	Keilexc. 26. 7.	3./4. 8. 9 Tg. früher	8. 8. 34
Desc. vag. dupl.	Plastik, Port. Amp. 28. 7.	4.-8. 8. 7 Tg. früher	18. 8. 34
Epilepsie	Keilexc. 9. 8.	11./12. 8. 14 Tg. früher	21. 8. 34
Schizophrenie	Keilexc. 13. 8.	15./16. 8. 3 Tg. früher	27. 8. 34
Angeb. Schwachsinn	Keilexc. 17. 8.	26.-28. 8. 11 Tg. früher	30. 8. 34
Schizophr., Adnexitis	Beide Adn. extirp. lk. Ovar implant. 20. 8.	21.-22. 8. 11 Tg. früher	1. 9. 34
Angeb. Schwachsinn	Keilexc. 22. 8.	3.-5. 9, 8 Tg. früher	6. 9. 34
Epilepsie	Keilexc. 25. 8.	28.8.-1.9. 9 Tg. früher	5. 9. 34
Angeb. Schwachsinn	Keilexc. 17. 8.	21.-22. 8. 7 Tg. früher	28. 8. 34
Epilepsie	Keilexc. 28. 8.	30.-31. 8. 19 Tg. früher	8. 9. 34

Lfd. №	Krankenblatt	Beginn und Art der Menstruation	Alter und Zahl der Partus	vorletzte Periode	letzte Periode
82	989/34	14 J., 4 Tg. 3—4 Tg.	29 J.	26.-30. 7.	23.-27. 8.
83	990/34	15 J., 4 / 5—5	27 J., 1 P.	23.-26. 7.	20.-24. 8.
84	1013/34	16 J., 4 / 3	30 J.	4Wch vorher	14.-17. 8.
85	1014/34	13 J., 4 / 6	25 J.	4Wch. vorher	14.-20. 8.
86	1086/36	13 J., 4 / 1—2	20 J.	3.-5. 8.	1.-3. 9.
87	1093/34	12 J., 3—4 / 3—4	22 J.	15.—18. 8.	7.-10. 9.
88	1117/34	15 J., 4 / 4	37 J. 3 P.	10.-13. 8.	5.-8. 9.
89	1129/34	12 J., 4 / 3—4	37 J., 1 P.	11.-14. 8.	8.-11. 9.
90	1144/34	15 J., 4 / 3	45 J., 1 P.	17.-19. 8.	15.-17. 9.
91	1145/34	12 J., 4 / 5	18 J.	24.-28. 8.	21.-25. 9.
92	1351/34	12 J., 4 / 4—5	32 J.	4Wch. vorher	28. 11.-2. 12.
93	1366/34	15 J., 4 / 3—4	35 J.	3.-6. 10.	1.-4. 11.
94	1382/34	15 J., 4 / 3—4	32 J., 2 P.	5.-8. 10.	2.-4. 11.
95	1391/34	16 J., 4 / 3—4	29 J., 2 P.	10.-13. 10	7.-10. 11.
96	1482/34	12 J., 4 / 5 6	44 J., 2 P.	4Wch. vorher	1. 12.
97	1513/34		27 J.		13. 12.
98	4/35	16 J., 4 / 4—5	29 J.	4Wch. vorher	22.-27. 12. 34

Diagnose	Art und Datum der Operation	Menstr. p. Op. zu früh eingetreten	Entlassung
circ. Irresein	Keilexc. 29. 8.	31. 8.-4. 9. 19Tg. früher	11. 9. 34
Schizophr.	Keilexc. 28. 8.	1.-8. 9. 16 Tg. früher	10. 9. 34
Schizophr.	Tube lks. u. r. u. lk Ovar Ovar exst. 3. 9.	5.-9. 9. 5Tg. früher	14. 9. 34
Schizophr.	Keilexc. 3. 9.	5.-9. 9. 5 Tg. früher	14. 9. 34
Epilepsie	Keilexc. Entf. d. r. Adn. 17. 9.	20. 9. 8 Tg. früher	9. 10. 34
Angeb. Schwachsinn	Keilexc. 27. 9.	4Wch. Cycl. 30. 9.-1. 10. 4 Tg. früher	8. 10. 34
Desc. vag. dupl.	Colp. dupl. 24. 9	24. 9. 5 Tg. früher	11. 10. 34
Epilepsie	Keilexc. 29. 9.	2.-4. 10. 3 Tg. früher	9. 10. 34
Schizophr.	Keilexc. per vaginam 2. 10.	5.-8. 10. 7Tg. früher	13. 10. 34
Angeb. Schwachsinn	Keilexc. 5. 10.	8.-11. 10. 10 Tg. früher	16. 10. 34
Schizophr.	Keilexc. 7. 12. lks. fehlt	10.-12. 12. 15Tg. früher	17. 12. 34
Schizophr.	Keilexc. 17. 11.	18.-20. 11. 10 Tg. früher	29. 11. 34
Desc. vag. dupl.	Colp. dupl, Port. amp. 23. 11.	26.-27. 11. 3Tg. früher	8. 12. 34
Dammriß	Plastik 26. 11.	26.-29. 11. 5 Tg. früher	13. 12. 34
Schizophr.	Keilexc., Ovarien entf. 17. 12.	19.-22. 12. 9Tg. früher	27. 12. 34
Angeb. Schwachsinn	Keilexc. 28. 12.	1.-4. 1. 8Tg. früher	8. 1. 35
Angeb. Schwachsinn	Keilexc. 4. 1.	6.-10. 1. 12Tg. früher	13. 1. 35

Lfd. №	Krankenblatt	Beginn und Art der Menstruation	Alter und Zahl der Partus	vorletzte Periode	letzte Periode
99	5/35	18 J., 4 Tg. 4—5 Tg.	29 J.	4Wch.vorher	18.-22.12.34
100	97/35	13 J., 4 / 3—4	17 J.,		7.-11. 1. 35
101	197/35	14 J., 4 / 3—4	21 J.,	4Wch.vorher	7.-10. 2.
102	213/35	12½ J., 4 / 3-4	39 J., 5 P.	4Wch.vorher	24.-28. 1.
103	229/35	16 J., 4 / 4-6	42 J., 3 P.	4.-14. 1.	28 1.-4. 2.
104	316/35	13 J., 4 / 4—5	38 J., 4 P.		26.2.-1. 3.
105	344/35	19 J., 4 / 3-4	37 J., 5 P.		4.-7. 3.
106	83/35	15 J., 4 / 3-4	31 J.,	4Wch.vorher	13.-15 1.
107	72/35	14 J., 3-4 / 2-3		11.-13. 12.	6.-8. 1.
108	62/35	13 J., 4 / 3	20 J.,	14Tg.vorher	7.-10. 1.
109	48/35	17 J., 4 / 4-5	43 J.,	Nov. 34	28.12.-1. 1.
110	1255/34	14 J., 3-4 / 3-4	19 J., 1 P.	8.-10. 9.	5.-7. 10.

Diagnose	Art und Datum der Operation	Menstr.p. Op. zu früh eingetreten	Entlassung
Angeb. Schwachsinn	Keilexc. 4. 1.	6.-9. 1. 8Tg. früher	15. 1. 35
Schizophr.	Keilexc. 20. 1.	23.-26. 1. 11 Tg. früher	2. 2. 35
Angeb. Schwachsinn	Keilexc. 19. 2.	19.-22. 2. 15 Tg. früher	1. 3. 35
Endogene Depression	Keilexc 15. 2.	17.-21. 2. 3Tg. früher	26. 2. 35
Leistenhernie lks. u r.	Herniotomie 16. 2.	19. 2. 5Tg. früher	9. 3. 35
Schizophr.	Keilexc. 9. 3.	17.-20. 3. 8 Tg. früher	20. 3. 35
Angeb. Schwachsinn	Keilexc. Amput. d. hint. M.M.Lippe 12. 3.	13.-20. 3. 18 Tg. früher	26. 3. 35
Schizophr.	Keilexc. 19. 1.	21.-26. 1. 19Tg. früher	30. 1. 35
Epilepsie	Keilexc. 16. 1.	18.-21. 1. 15 Tg. früher 4Wch.Cycl.	28. 1. 35
Schizophr.	Keilexc. 14. 1.	17.-21. 1. 17 Tg. früher	25. 1. 35
Schizophr.	Keilexc. d. lk. Tube Entf. d. r. Adnexe 11. 1.	14.-22. 1. 10Tg. früher	22. 1. 35
Angeb. Schwachsinn	Keilexc. 24. 10.	28.-31. 10. 4 Tg. früher 4 Wch. Cycl.	19. 11. 34

Lfd. №	Krankenblatt	Beginn und Art der Menstruation	Alter und Zahl der Partus	vorletzte Periode	letzte Periode
1	70/32	13 J., 28 Tg. 3 Tg.	21 J.	29. 12.-2. 1. 31	25. 1.
2	101/32	12 J., 28	23 J., 2P.	17.-25. 12 31	14.-21. 1.
3	130/32	17 J., 28 / 2—3	39 J., 1P.	4 Wch. vorher	9.-12. 1. 9.-12. 2.
4	240/32	14 $\frac{1}{2}$ J., 28 / 2—3	32 J., 2P.	30. 1.-2. 2.	2.-4 3.
5	401/32	16 J., 28 / 3—4	37 J.	12.-16. 3.	24.-29. 4.
6	404/32	14 J., 28 / 4—5	27 J.,	24.-28. 3.	21 4.
7	414/32	14 J., 28 / 4—5	22 J.,	21.-25. 3.	19.-23. 4.
8	438/32	16 J., 28 / 3—4	27 J.,		30. 4.-2. 5.
9	480/32	11 J., 21 / 10—12	29 J.,	April 14 Tg.	6.-26. 5.
10	491/32	13 J., 21 / 5—6	36 J., 1P.	Febr. 7 Tg.	12.-14. 5.
11	494/32	15 J., 28 / 3—4	34 J., 2P.	20.-23. 4.	19.-23. 5.
12	522/32	14 J., 4—5 / 4—5	17 J.,	16.-20. 4.	14.-18. 5.
13	524/32	11 J., 28 / 6—7	32 J., 4P.	15.-19. 5.	29. 5.-4. 6.
14	581/32	12 J., 28 / 3	33 J., 2P.	28 Tg. früher	27.-29. 5.
15	583/32	13 $\frac{1}{2}$ J., 30 / 3	26 J., 1P.	10.-13. 5.	16.-19. 6.
16	588/32	14 J., 28 / 4—5	39 J.,	8.-13. 5.	17.-22. 6.
17	638/32	11 J., 21 / 2—3	45 J., 2P.	28.-31. 5.	25.-27. 6.
18	644/32	14 J., 28 / 4	36 J., 2P.	5.-9. 6.	3.-7. 7.

Diagnose	Art und Datum der Operation	Menstr. post op. ausgebl.	Entlassung
Adnexitis subac. r.	Appect Probelaparatomie 28. 1. 32		11. 2. 32
stielgedr. Cyste	Laparat. 29. 1		10. 2. 32
Desc. vag. dupl.	Colpor dupl. 15. 2.		17. 3. 32
Desc. vag. dupl. Retroflex. ut.	Doléris Colpor dupl. 9. 3.		31. 3.
Adnex. Tumor lks.	Salpingoophoect. lks. 7. 5.		5. 6. 32
Intraperiton. Absc. nach Fehlgeburt	Laparat. Drainage d. Absc. 8. 5.	7.-11. 6. eingetr.	16. 8.
Senkgs. Absc. d. lk. Beckenw.	Laparat. 9. 5.		28. 5. 32
Ovarcyste r. Retroflex. ut.	Doléris, Ovarresect. r. 17. 5.		15. 6. 32
Adnex. Tumor lks.	Doléris Appect. Salpingooph. lks. 31. 5.	16. 6. normal eingetr. einmal ausgebl.	18. 6. 32
Desc. vag. dupl.	Colpor dupl. 1. 6.		18. 6. 32
Desc. vag. dupl Retroflex. ut.	Doléris Colpor dupl. 11. 6.		26. 6. 32
Paraovarcyste r.	Lapar., operiert währ. d. Menstr.	10. 6. ausgebl. 8.-8. 7. normal eingetr.	9. 7. 32
Paraovarcyste lks.	Salpingooph. lks. 11. 6.		26. 6.
Ovarcyste lks.	Ovariectom. lks. 1. 7.		27. 7. 32
Retroflex. ut.	Doléris, Keilexc. aus d. r. Ovar 4. 7.		23. 7. 32
Carcinosis peritonei	Probelapar. 5. 7.		18. 7. 32
Prolaps. Elongatio colli	Plastik, Portio Amput. 23. 7.		14. 8. 32
Elongatio Colli Desc. vag. dupl.	Plastik, Collum-Amput. 19. 7.		6. 8. 32

Lfd. Nr.	Krankenblatt	Beginn und Art der Menstruation	Alter und Zahl der Partus	vorletzte Periode	letzte Periode
19	664/32	14 J., 28 / 3	35 J., 4 P.	5.-7. 6.	5.-8. 7.
20	675/32	15 J., 28 / 2-4	35 J., 2 P.	24.-27. 6.	19.-22. 7.
21	785/32	15 J., 28 / 4-5	34 J., 2 P.	5.-8. 7.	2.-5. 8.
22	932/32	13 J., 28 / 3-6	48 J., 7 P.	25.-30. 8.	21.-25. 9.
23	971/32	16 J., 21 / 4-5	30 J., 3 P.	12.-17. 9.	3.-9. 10. 25. 10.
24	1038/32	15 J., 28 / 4-5	28 J., 2 P.	13.-16. 10	15.-17. 11.
25	1058/32	15 J., 28 / 5-7	38 J. 3 P.	21.-28. 9.	12.-20. 10.
26	1102/32	14 J., 28 / 6-8	32 J., 2 P.	7.-13. 11.	8.-13. 12.
27	1132/32	13 J., 25-31 / 8-10	32 J., 2 P.	3.-13. 11.	26.11.-5.12.
28	1150/32	12 J., 28 / 3	36 J., 2 P.	12.-15. 11.	10.-13. 12.
29	410/32	15 J., 28 / 3-4	33 J.,	27.-30. 3.	26.4.-1. 5. 3.-4. 5.
30	3/33	12 J., 28 / 3	29 J., 1 P.	19.10.-1.11.	26.-29. 11.
31	40/33	15 J., 3-7 / 3-4	22 J., 2 P.	15.-20. 11.	14.-18. 1.
32	61/33	15 J., 28 4 / 5	33 J.,	20.-24. 12.	11. 1.-15. 1.
33	95/33	28 / 3-4	28 J., 1 P.	15.-19. 12.	18.-21. 1.
34	119/33	15 J., 3-4 / 2-3	40 J., 3 P.	29. 1.-1. 2	17.-21. 2.

Diagnose	Art und Datum der Operation	Menstr. post Op. ausgebl.	Entlassung
Status n. mehrf. Eklampsie; Nephropathie	Tubenunterb. lks. u. r.		18. 8. 32
Retroflex. ut., Desc. vag., dupl.	Doléris, Plastik 29. 7.		20. 8. 32
Retroflex. ut. mob.	Portio-Amput. Alex. Adam und Herniotomie 24. 8.	23. 11.	9. 9. 32
Retroflex. ut. Hypergland. u. polypartige Wucherung	Portio-Amput. Doléris. App.-ectomie 12. 10.		6. 11. 32
Desc. vag. dupl. Ectr. d. vord. Mm.-Lippe	Plastik. keilf. Amput. der Mm.-Lippe 5. 11.		20. 11. 32
Salpingitis r., Appendicitis	App. Ect., Keilresek. d. r. Ovars, Tubenentfern. r. 23. 11	vorl. P. 4 W früher 6.-10. 3. 33	22. 12. 32
Retroflex. ut. Ovarcyste lks. Nabelhernie	Doléris, Plastik d. Hernie, Ovarresectio lks. 29. 11.		17. 12. 32
Dermoid beider Ovarien	r. Ovar entf.; Keilres. d. l. Ov. 19. 12.		10. 1. 33
Erosio gland.	Portio-Amput. 16. 12.		7. 1. 33
Desc. vag. dupl.	Plastik, Portio-Amput. 29. 12.		14. 1. 33
Myom	Enucleatio 12. 5.	22. 10.-25. 10. 22. 11.-25. 11.	1. 6. 32
Erosio gland.	Portio-Amput. 3. 1. 33		15. 1. 33
Retroflex. ut. mob.	Doléris, App., Ectom. 23. 1.		11. 2. 33
Ovarcyste lks.	lk. Ovar u. Cyste entf. 20. 1.		7. 2. 33
Tubarruptur r. Corp. lut. Cyste r.	r. Tube entf., Keilexc. d. r. Ovars 23. 1.	Nachunter. 24. 4. 33, Periode s. Op. ausgebl.	9. 2. 33
Desc. vag. dupl. Erosio portio	Interpositio, Tubenunterbind., Portio-Amput., Plastik 25. 2.		1. 4. 33

Lfd. №	Krankenblatt	Beginn und Art der Menstruation	Alter und Zahl der Partus	vorletzte Periode	letzte Periode
35	169/33	14 J., 28 Tg. 3—4 Tg.	30 J., 2P.	4Wch vorher	15.-21. 2.
36	191/33	15 J., 28 / 3—4	29 J., 2P.	22.-25. 1.	20.-23. 2.
37	195/33	17 J., 30 / 5	37 J.	4Wch. früher	22.-26. 2.
38	296/33	11 J., 28 / 3	46 J., 2P.		20.-23. 3.
39	423/33	14 J., 25 / 3—4	32 J., 3P.	1.-5. 4.	27.-30. 4.
40	483/33	14 J., 33—35 / 8—10	34 J.	5Wch. vorher	25. 4.-2. 5.
41	552/33	11 J., 21 / 6—8	24 J.	3Wch. vorher	27. 5.-3. 6.
42	650/33	15 J., 28 / 4—8	40 J., 2P.	4Wch. vorher	9.-16. 6.
43	666/33	16 J., 28 / 3—4	33 J., 2P.	2.-5. 6.	24.-26. 6.
44	764/33	12 J., 21—28 / 3—5	39 J.	10.-14. 6.	7. 7.-10. 7.
45	690/33	14 J., 21 / 5—6	39 J., 4P.	3Wch. vorher	1.-6. 7.
46	776/33	11 J., 21—28 / 3—4	36 J., 3P.	3Wch vorher	17.-20. 7.
47	1175/33	12 J., 28 / 8	33 J., 1P.	3Wch. vorher	7.-14. 11.
48	64/34	16 J., 28 / 3—4	23 J.	1.—8. 12 33	1.-14. 1. 34 23.-28. 1.
49	87/34	14 J., 21—28 / 4—5	36 J., 2P.	16.-20. 12.	14.-18. 1.
50	92/34	16 J., 28 / 4—5	29 J., 2P.	18.-22. 12.	17.-22. 1.
51	174/34	14 J., 28 / 2—3	36 J., 1P.	18.-11. 1.	27. 1.-6. 2.
52	258/34	12 J., 21 / 4—5	41 J.	3.-8. 2.	18.-23. 2.

Diagnose	Art und Datum der Operation	Menstr. post Op. ausgebl.	Entlassung
Retroflex. ut.	Dolérís 4. 3.		21. 3.
Desc. vag. dupl. Appendicitis	Plastik, Portio-Amput. App.ectom. 3. 3.		25. 3.
Ovarcyste lks. Retroflex. ut.	Entf. d. lk. Tube, u. d. Cyste, Dolérís, App ectom. 7. 3.		29. 3.
Desc. vag. dupl. Parametr. Absc.	Interpositio, Plastik 31. 3.	16. 4. ausgebl. 13., 14. 5. } ein- 5.-8. 6. } ge- 28.-30. 6. } tr.	27. 7. 33
Desc. vag. dupl. Erosio Port.	Plastik, Portio-Amp. 6. 5.		26. 5. 33
Interst. Myom Haematocele lks.	lk. Adn. entf. Myom- Enucleat. 17. 5.		3. 6. 33
Retroflex. ut.	Dolérís 8. 6.		10. 7. 33
Desc. ovar. u. Einklemmung	Lösung d. Adhäsion 1 7.		26. 7. 33
Retroflex. ut. Desc. vag. dupl.	Dolérís, Portio-Amput., Plastik 5. 7.		21. 7. 33
Gestieltes Myom, r. Ovar vergr.	Myom u. Adn. r. entf. 1. 8.		17. 8. 33
Dammriß, Desc. vag. complet.	Plastik, Interpositio 27. 7		16. 8. 33
Desc. vag. dupl.	Plastik 2. 8.		21. 8. 33
Myom, Retroflex. ut.	Dolérís, Enucleatio, Port.- Amp. 27. 11.		19. 12. 33
Chron. Appendicitis, Paratyphus p. op.	r. Adn. entf., App ectom. 6. 2.		17. 3. 34
Retroflex. ut. Paratyphus p. op.	Dolérís, Port.-Amput.		18. 3. 34
Desc. vag. dupl. Paratyphus p. op.	Plastik 31. 1.	29./30. 3.	31. 3. 34
Erosio glandul	Portio-Amput. 14. 2.	8.-11. 4. (Nachunters.)	24. 2. 34
Leistenhernie u. Verwachsungen	Lösg. d. Verwachs., Her- niotomie 5. 3.		18. 3. 34

Lfd. Nr.	Krankenblatt	Beginn und Art der Menstruation	Alter und Zahl der Partus	vorletzte Periode	letzte Periode
53	277/34	14 J., 21 Tg. 6—8 Tg.	30 J.	14.-19. 2.	11. 3.
54	549/34	18 $\frac{1}{2}$ J., 28 / 4—5	35 J., 2 P.	28 Tg. vorher	14.-18. 4.
55	634/34	13 J., 28 / 5—6	29 J., 2 P.	19.-25. 4.	21.-26. 5.
56	644/34	14 J., 28 / 3—4	20 J.,		31.5.-2. 6.
57	691/34	13 J., 28 / 7 - 8	42 J., 7 P.	4 Wch. früher	4.-11. 6.
58	716/34	16 J., 4—5 Wch. / 4—5	25 J., 2 P.	5 Wch früher	8.-12. 6.
59	722/34	14 J., 2 Wch., seit 2—3 Monaten	41 J., 1 P.	14. 6.	23.-24. 6.
60	743/34	19 J., 28 / 3—4	26 J.,	Anfang Mai	Anfang Juni
61	756/34	21 J., 21—28 / 8	51 J., 2 P.	14 Tg. vorher	22.-26. 6.
62	1190/34	17 J., 28 / 3—4, bei Auf- regung 2 Wch -Cyclus	41 J.,	24.-27. 9.	10.-13. 10.
63	1192/34	14 J., 28 / 4—6	21 J.,	30. 8.-3. 9.	26.-30. 9.
64	1283/34	16 J., 28 / 5—6	32 J., 4 P.	10.-14. 9.	12.-16. 10.
65	1284/34	14 J., 28 / 5—8	26 J., 2 P.	15.-19. 9.	15.-19. 10.
66	1296/34	20 J., 28 / 8	25 J., 1 P.		25. 9.-3. 10.
67	802/34	13 J., 28 / 4—7	37 J., 2 P.	4 Wch. früher	1.-6. 7.
68	973/34	15 J., 28 / 4—5	42 J., 14 P.	3.-6. 7.	1.-5. 8.
69	1015/34	13 J., 28 / 3—4	32 J.,	4 Wch. vorher	3 Wch. vor 1.9.
70	1047/34	15 J., 28 / 2—3	38 J.,	27.-30. 7.	24.-26. 8.
71	1049/34	18 J., 28 / 3	23 J.,	4 Wch. vorher	4.-7. 9.
72	1089/34	16 J., 28 / 3—4	37 J., 1 P.	21.-26. 8.	21.—23. 9.
73	1110/34	17 J., 28 / 3	26 J.,	6.-8. 8.	2.-4. 9.
74	1120/34	19 J., 28 / 4	33 J., 2 P.	13.-16. 8.	16.-19. 9.
75	1121/34	11 J., 28 / 3—4	22 J.,	7.-10. 8.	3.-6. 9.

Diagnose	Art und Datum der Operation	Menstr. post Op. ausgebl.	Entlassung
lk. Ovar kl. cyst. degen.	lk. Adn. entf. App.-Ectomie 23. 3.		8. 4. 34
Epilepsie Hysterie	Keilexc., sec. Wund- heilung 2. 5.		5. 6. 34
Desc. vag. Erosio port.	Plastik, Portio Amp. 6. 6.		24. 6. 34
angeb. Schwachsinn	Keilexc. 14. 6.		28. 6. 34
man. depr.	Exc. d. r. Tube, Keilexc. d. lk. Tube 25. 6.		11. 7. 34
man. depr.	Keilexc. 30. 6.		11. 7. 34
Salpingitis Ovarabsc. r.	r. Adn. entf. 25. 6.		21. 7. 34
Schizophren	Keilexc. 30. 6.		18. 7. 34
Desc. vag. post.	Plastik 4. 7.		28. 7. 34
Schizophr. Schwachsinn	r. Adn. entf. Keilexc. 18. 10.		2. 11. 34
angeb. Schwachsinn	Keilexc. 12. 10.		23. 10. 34
angeb. Schwachsinn	Keilexc. 3. 11.		14. 11. 34
Schizophr.	beide Tuben exstirpiert 29. 10.		11. 11. 34
angeb. Schwachsinn	Keilexc. 21. 10.		24. 11. 34
Epilepsie	Keilexc. 17. 7.		30. 7. 34
man. depr.	Keilexc. 24. 8.		4. 9. 34
Schizophr.	Keilexc. 8. 9.		19. 9. 34
Epilepsie	Op. nach Menge r. Ov. exstirp. 11. 9.		24. 9. 34
Epilepsie	Keilexc. 11. 9.		9. 10. 34
Scheiden-Blasenfistel	Fisteloper. 2. 10.		3. 11. 34
Schizophr.	Keilexc. 22. 9.		2. 10. 34
man. depr.	Keilexc. 28. 9.		13. 10. 34
Epilepsie	Keilexc. 26. 9.		7. 10. 34

Lfd. Nr.	Krankenblatt	Beginn und Art der Menstruation	Alter und Zahl der Partus	vorletzte Periode	letzte Periode
76	1125/34	14 J., 28 Tg. 3—4 Tg.	25 J.,	4Wch.vorher	10.-13. 9.
77	1128/34	13 J., 3—4 / 4—6	28 J.,	14.-18. 8.	10.-15. 9.
78	1130/34	16 J., 28 / 4—6	28 J.	21.-22. 8.	18.-22. 9.
79	1341/34	19 J., 28 / 4—6	44 J., 1P.	6.-11. 10.	4.-10. 11.
80	1370/34	12 J., 28 / 5—6	23 J.,	12.-18. 10.	8.-17. 11.
81	1372/34	18 J., 28 / 2	33 J.,	6.-7. 10.	3.-5. 11.
82	1410/34	19 J., 28 / 3 4	39 J., 5P.	8.-15. 10.	14.-17. 11.
83	1484/34	13 J., 28 / 2—5	35 J., 3P.	4Wch.früher	6.-10. 12.
84	1487/34	15 J., 28 / 3	38 J.,	1.-4. 11.	4.-7. 12.
85	1491/34	17 J., 5—6 / 4—5	33 J., 1P.	4Wch.früher	26.-30. 11.
86	1512/34	14 J., 28 / 5—6	21 J.,		6. 12.
87	6/35	28 / 4—5	21 J.,	4Wch.früher	19.-23. 12.
88	177/35	14 J., 28 / 3—4	37 J.,	4Wch.früher	19.-22. 1.
89	237/35	14 J., 28 / 3	39 J., 3P.	4Wch vorher	28.-31. 1.
90	343/35	13 J., 21 / 3—4	23 J.,		26. 2.-2. 3.
91	138/35	16 J., 4 / 2—3		4Wch vorher	16.-19.12. 34
92	135/35	14 J., 4 / 5—6	30 J.,	13.-18. 1.	13.-18. 1.
93	77/35			3.-7. 12.	1.-4. 1. 16.-19. 1.
94	33/34	14 J., 4 / 4	22 J.,	7.-11. 12. 33	1. 1. 34
95	17/32	16 J., 4 / 3	41 J., 5P.	13.-16. 11. 31	13.-6. 12.
96	49/32	11 J., 4 / 3	35 J., 2P.	4.-9. 12. 31	2.-7. 1. 32

Diagnose	Art und Datum der Operation	Norm. Menstr. post op. aus- gebl.	Entlassung
Schizophr. Corp. lut. Haematom	Keilexc. d. Tuben " ausbeiden Ovarien 26. 9.		8. 10. 34
Angeb. Schwachsinn	Keilexc. 24. 9.		9. 10. 34
Angeb. Schwachsinn	Keilexc. 24. 9.		9. 10. 34
Schizophr.	Keilexc. 14. 11.		7. 12. 34
Adhaesionen	Bauchdeckenplastik, Lösng. d. Adh. 20. 11.		7. 12. 34
Epilepsie	Keilexc. 19. 11.		30. 11. 34
Blasen-Scheidenfistel	Plastik 30. 11.		22. 12. 34
Schizophr.	lk. Adn. entf. Keilexc. 17. 12.		6. 1. 35
Intralig. Ovarcyste	Cyste u. r. Adn. exstirp. 20. 12.		16. 1. 35
Epilepsie	Keilexc. 18. 12.	ausgebl. bei 4 Wch.-Cycl.	29. 12. 34
Schizophr.	Keilexc. 28. 12.		7. 1. 35
Angeb. Schwachsinn	Keilexc. 5. 1.		21. 1. 35
Schizophr.	lk. Adn. exstirp. Keilexc. d. r. Tube 11. 2.		22. 2. 35
Schizophr. Desc. vag. dupl.	Keilexc. Plastik 20. 2.		13. 3. 35
Angeb. Schwachsinn Ovartumor r.	lk. Tube exc. r. Adn. exstirp. 13. 3.		27. 3. 35
Schizophr.	Keilexc. 30. 1.		12. 2. 35
Retroflex ut.	Dolérís 24. 1.		24. 2. 35
Schizophr.	Keilexc. 21. 1.		14. 2. 35
Retroflex. ut.	Dolérís 13. 1.		29. 1. 34
Hernia inquin. Retroflex ut. Desc. vag.	Bassini, Colpor 8. 1. 32	13.-18. 1. 4Tg zu spät	3. 2. 32
Desc vag dupl.	Colpor dupl. 20. 1.	3.-6. 2. 5Tg, zu spät	10. 2. 32

Lfd. №	Krankenblatt	Beginn und Art der Menstruation	Alter und Zahl der Partus	vorletzte Periode	letzte Periode
97	189/32	13 J., 4 Tg. 3—5 Tg.	23 J.	4Wch.vorher	7.-9. 3.
98	433/32	12½ J., 4 / 4—5	37 J., 3P.	25.-28. 3.	21.-27. 4.
99	629/32	14 J., 4 / 8	22 J.	24. 5.-1. 6.	21.-26. 6.
100	1087/32	14 J., 4 / 3	48 J., 3P.	10.-14. 10.	7.-9. 11. 5./6. 12.
101	768/33	17 J., 4 / 4—6	38 J., 2P.	4Wch.vorher	15.-19. 7.
102	1167/33	11 J., 4 / 5	18 J.	Mitte Okt.	11.-15. 11.
103	7/34	12 J., 3—3½ / 6—8	49 J. 3P.	23Tg. vorher	18 -28. 11.
104	186/34	15 J., 4 / 8	39 J., 3P.	4Wch vorher	10.-15. 1.
105	566/34	11 J., 4 / 2—3	33 J., 3P.		19.-24. 4.
106	568/34	18 J., 4 / 3—4	41 J., 3P.	8.-12. 4.	4.-9. 5.
107	173/32	16 J., 4 / 3—4	30 J.	16.-20. 1.	13.-17. 2.
108	410/32	15 J., 4 / 3—4	32 J.	27.-30. 3.	26. 4.-1. 5.
109	745/34	14 J., 4 / 3—4	30 J., 1P.		7. 6.
110	886/32	19 J., 4 / 3	44 J., 4P.	22.-27. 8.	19.-24. 9.

Diagnose	Art und Datum der Operation	Norm.Menstr. post op. aus- gebl.	Entlassung
Periton. Tb.	Probelapar. 12. 3.	8. 12. 4. 5 Tg. zu spät 6.-9. 5. norm.	25. 5. 32
Retroflex. ut., Desc. vag., dupl.	Doléris, Colpor dupl. 14. 5.	25.-29. 5. 7 Tg. zu spät	2. 6. 32
Peritonitis	Lapar. 18. 7.	23.-26. 7. 5 Tg. zu spät 10.-15. 10.	3. 11. 32
Desc. vag. dupl.	Interpositio hint. Plastik Steril. 10. 12.	10. 1. 8 Tg. zu spät	14. 1. 32
Myom, Erosio glandul.	Myom u. r. Adn. entf., Port. amp 2. 8.	18. 8. 7 Tg. zu spät	18. 8. 33
Appendicitis Retroflex. ut.	Doléris, App ectomie Keilexc. aus d. r. Ovar 21. 11.	14.-19. 12. 6 Tg. zu spät 11. 13. 1.	13. 12. 33
Desc. vag. dupl.	Plastik 8. 1. 34	14.-16. 1. 13 Tg. zu spät b. 23 T. Cycl.	7. 2. 34
Erosio glandul.	Port amp. 7. 2.	9./10. 2. 2 Tg. zu spät	14. 2. 34
Man. depr.	Keilexc. 14. 5.	23.-25. 5. 7 Tg. zu spät	27. 5. 34
Leistenhernie Desc. vag dupl.	Herniotomie Plastik 14. 5.	4. 6. 4 Tg. zu spät	13. 6. 34
Retroflex. ut. Adnexitis r.	Doléris, Adn. exstirp.		12. 3. 32
Ut. Myom	Enucleatio 12. 5.		1. 6. 32
Schizoochr.	Keilexc. 6. 7.	8.-10. 7. 4 Tg. zu spät	19. 7. 34
Ovarcyste r. lks.	Ovarentf. r. u. lks. 6. 10.		26. 10. 32

Menstr. p. op. normal eingetreten.

Operationstag im
5.—15. Tag des Intervalles.

Lfd. Nr.	7 / 10. Tag
	11 / 10. "
	13 / 14. "
	17 / 13. "
	39 / 8. "
	46 / 12. "
	49 / 9. "
	57 / 13. "
	58 / Int. Menstr.

9 Fälle 5—15. Tag = 14,28 %

54 „ 15—28. „ = 85,72 %

63 Fälle Menstr. p. op. normal eingetr.

Von 283 Fällen insgesamt = 22,26 %.

Operationstag im
15.—28. Tag des Intervalles.

Lfd. Nr.	1 / 23. Tag	61 / 32. Tag
	2 / 27. "	62 / 29. "
	3 / 25. "	63 / 35. "
	4 / 16. "	
	5 / 24. "	
	6 / 21. "	
	8 / 23. "	
	9 / 18. "	
	10 / 28. "	
	12 / 26. "	
	14 / 28. "	
	14 / 20. "	
	16 / 26. "	
	18 / Prae Menstr.	
	19 / 24. Tag	
	20 / 25. "	
	21 / 26. "	
	22 / 20. "	
	23 / 25. "	
	24 / 20. "	
	25 / 19. "	
	26 / 26. "	
	27 / 17. "	
	28 / 18. "	
	29 / 27. "	
	30 / Prae Menstr.	
	31 / 28. Tag	
	32 / 27. "	
	33 / 28. "	
	34 / 21. "	
	35 / 24. "	
	36 / 27. "	
	37 / 27. "	
	38 / 21. "	
	40 / 26. "	
	41 / 27. "	
	42 / 20. "	
	43 / 25. "	
	44 / 17. "	
	45 / 26. "	
	47 / 21. "	
	48 / 27. "	
	50 / 27. "	
	51 / 22. "	
	52 / 24. "	
	53 / 21. "	
	54 / 28. "	
	55 / 21. "	
	56 / 23. "	
	59 / 30. "	
	60 / 33. "	

Norm. Menstr. p. op. ausgeblieben.

Operationstag im 1.—4. Tag des Intervalles.		Operationstag im 5.—15. Tag des Intervalles.	
Lfd. Nr.		Lfd. Nr.	
1	4. Tag	3	7. Tag
59	3. "	4	8. "
60	Post menstr.	5	14. "
109	4. Tag	13	14. "
	4 Tage später eingetreten.	14	9. "
		20	11. "
		23	12. "
		24	9. "
		26	12. "
		29	10. "
		30	12. "
		31	10. "
		32	10. "
		33	6. "
		34	9. "
		36	12. "
		37	14. "
		38	12. "
		39	10. "
		41	12. "
		43	12. "
		48	15. "
		50	15. "
		53	13. "
		56	15. "
		61	13. "
		62	9. "
		65	15. "
		71	8. "
		72	12. "
		74	13. "
		77	15. "
		79	11. "
		80	13. "
		83	12. "
		91	15. "
		92	12. "
		93	6. "
		94	13. "
		97	6. "
		100	6. "
		102	11. "
		103	8. "
		106	11. "
		107	10. "
			5 Tage später
			8 " "
			6 " "
			13 " "
			4 " "

Operationstag im 1.—4. Tag des Intervalles.	Operationstag im 5.—15. Tag des Intervalles.
Lfd. Nr. 43 / 2. Tag 24 Tage früher	Lfd. Nr. 6 / 12. Tag 10 Tage früher
	10 / 12. " 5 " "
	11 / 13. " 5 " "
	15 / 11. " 15 " "
	17 / 13. " 11 " "
	18 / 15. " 11 " "
	19 / 15. " 3 " "
	20 / 10. " 8 " "
	21 / 12. " 15 " "
	22 / 13. " 12 " "
	25 / 9. " 12 " "
	28 / 10. " 4 " "
	30 / 10. " 14 " "
	33 / 9. " 9 " "
	38 / 12. " 10 " "
	40 / 8. " 18 " "
	46 / 15. " 5 " "
	48 / 10. " 14 " "
	49 / 14. " 5 " "
	50 / 14. " 12 " "
	51 / 12. " 3 " "
	52 / 13. " 11 " "
	53 / 7. " 10 " "
	57 / 15. " 10 " "
	56 / 12. " 15 " "
	60 / 11. " 14 " "
	61 / 11. " 14 " "
	62 / 10. " 10 " "
	63 / 11. " 11 " "
	65 / 9. " 17 " "
	66 / 6. " 12 " "
	67 / 6. " 17 " "
	69 / 9. " 17 " "
	71 / 9. " 14 " "
	72 / 11. " 9 " "
	73 / 14. " 7 " "
	74 / 12. " 14 " "
	76 / 8. " 11 " "
	78 / 8. " 8 " "
	81 / 7. " 19 " "
	82 / 7. " 19 " "
	83 / 9. " 16 " "
	91 / 15. " 10 " "
	92 / 10. " 15 " "
	100 / 14. " 11 " "
	101 / 13. " 15 " "
	104 / 12. " 8 " "
	105 / 9. " 18 " "
	106 / 7. " 19 " "
	107 / 11. " 15 " "
	108 / 8. " 17 " "
	109 / 15. " 10 " "

Menstr. p. op. zu früh aufgetreten.

Operationstag 15.—28. Tag des Intervalles.			
Lfd. Nr.	1	21. Tag	5 Tage früher
	2	/ 26. "	4 " "
	3	/ 16. "	10 " "
	4	/ 19. "	8 " "
	5	/ 20. "	6 " "
	7	/ 17. "	9 " "
	8	/ 22. "	3 " "
	9	/ 16. "	4 " "
	12	/ 24. "	4 " "
	13	/ 20. "	6 " "
	14	/ 20. "	7 " "
	16	/ 20. "	4 " "
	23	/ 18. "	8 " "
	24	/ 20. "	5 " "
	26	/ 24. "	4 " "
	27	/ 20. "	6 " "
	29	/ 17. "	8 " "
	31	/ 16. "	8 " "
	32	/ 18. "	3 " "
	34	/ 19. "	8 " "
	35	/ 19. "	5 " "
	36	/ 18. "	3 " "
	37	/ 23. "	4 " "
	39	/ 24. "	3 " "
	41	/ 12. "	3 " "
	42	/ 20. "	5 " "
	44	/ 19. "	4 " "
	45	/ 18. "	8 " "
	47	/ 20. "	5 " "
	54	/ 16. "	6 " "
	55	/ 18. "	9 " "
	58	/ 22. "	5 " "
	59	/ 23. "	3 " "
	64	/ 22. "	6 " "
	68	/ 18. "	9 " "
	70	/ 24. "	3 " "
	75	/ 24. "	3 " "
	77	/ 16. "	11 " "
	79	/ 16. "	9 " "
	80	/ 17. "	7 " "
	84	/ 21. "	5 " "
	85	/ 21. "	5 " "
	86	/ 17. "	8 " "
	87	/ 21. "	4 " "
	88	/ 20. "	5 " "
	89	/ 22. "	3 " "
	90	/ 18. "	7 " "
	93	/ 17. "	10 " "
	94	/ 22. "	3 " "
	95	/ 20. "	5 " "
	96	/ 17. "	9 " "
	97	/ 16. "	8 " "

Operationstag 15.—28. Tag des Intervalles.			
Lfd. Nr.	98	24. Tag	12 Tage früher
	99	/ 18. "	8 " "
	102	/ 23. "	3 " "
	103	/ 20. "	5 " "
	110	/ 20. "	4 " "

1 Fall im Interv. vom 1.—4. Tag
= 0,91 %.

52 Fälle " " " 5.—15. Tag
= 47,28 %.

57 " " " 15.—28. Tag
= 51,81 %.

110 Fälle Menstr. zu früh aufgetreten.

Von 283 Fällen insgesamt = 38,87 %.

Normale Menstr. p. op. ausgeblieben.

Operationstag im
15.—28. Tag des Intervalles.

Lfd. Nr.	2 / 16. Tag
	6 / 18.
	7 / 17.
	8 / 18.
	9 / 26.
	10 / 20.
	11 / 24.
	12 / 28.
	15 / 19.
	16 / 19.
	17 / 28.
	18 / 17.
	19 / 25.
	21 / 23.
	22 / 22.
	25 / 22.
	27 / 21.
	28 / 20.
	35 / 18.
	40 / 23.
	42 / 23.
	44 / 26.
	45 / 27.
	46 / 17.
	47 / 21.
	49 / 17.
	51 / 20.
	52 / 16.
	54 / 19.
	55 / 17.
	57 / 22.
	58 / 23.
	63 / 17.
	64 / 23.
	66 / 27.
	67 / 17.
	68 / 24.
	69 / Prae Menstr.
	70 / 19.
	73 / 21.
	75 / 24.
	76 / 17.
	78 / 17.
	81 / 17.
	82 / 17.
	84 / 17.
	85 / 23.
	86 / 23.
	87 / 18.
	88 / 24.
	89 / 24.
	90 / 16.

Lfd. Nr.	95 / 27. Tag	4	Tage später
	96 / 19.	5	" "
	98 / 24.	7	" "
	99 / 28.	5	" "
	101 / 19.	7	" "
	104 / 28.	2	" "
	105 / 26.	7	" "
	108 / 17.	"	"
	110 / 18.	"	"

4 Fälle im Intervall vom 1.—4. Tag
= 3,64 %
45 " " " " 5.—15. Tag
= 40,91 %
61 " " " " 15.—28. Tag
= 55,45 %

110 Fälle Normale Menstr. ausgeblieben

Von 283 Fällen insgesamt = 38,87 %

Normale Menstr. nach Sterilisierung.
29 Fälle von 122 Sterilisierungen = 23,77 %.

Operationstag im

15.—28. Tag des Intervalles.

Lfd. Nr.	22	/	20.	Tag Salpingoophorectom. doppelseitig. Keilresectio a. d. l. Ovar.
	28	/	18.	" Keilexcisio.
	30	/	Prae Menstr.	Keilexcisio. und aus beiden Ovarien.
	31	/	28.	Tag Keilexc.
	33	/	28.	" "
	34	/	21.	" "
	35	/	24.	" Sterilis. Adnexe l. entfernt.
	36	/	27.	" Keilexc.
	37	/	27.	" "
	40	/	26.	" "
	41	/	27.	" "
	42	/	20.	" "
	43	/	25.	" Keilexc. der l. Tube. Adnexe r. entfernt.
	44	/	17.	" Keilexc.
	45	/	26.	" "
	47	/	21.	" "
	48	/	27.	" "
	50	/	27.	" "
	51	/	22.	" "
	52	/	24.	" "
	53	/	21.	" "
	54	/	28.	" Tube r. entfernt. Tube l. Keilexc.
	56	/	23.	" Keilexc.
	60	/	33.	" "
	61	/	32.	" "
	62	/	Tube l.	entfernt.
			Tube r.	Keilexc. Myomexcision. 29. Tag.
	63	/	35.	Tag Keilexc.

Operationstag im

5.—15. Tag des Intervalles.

Lfd. Nr.	49	/	9.	Tag Keilexc.
	58	/	Intermenstr.	Keilexc.

27 Fälle im Intervall vom 15.—28. Tag = 93,13 %.

2 " " " " 5.—15. " = 6,87 %.

Operationstag im
15.—28. Tag:

Lfd. Nr.	19	/	25. Tag	Tuben-Unterbindung l. und r.
	54	/	19.	" Keilexc.
	57	/	22.	" "
	58	/	23.	" "
	63	/	17.	" "
	64	/	23.	" "
	65	/	15.	" Beide Tuben entfernt.
	66	/	27.	" Keilexc.
	67	/	17.	" "
	68	/	24.	" "
	69	/		" Prae Menstr.
	70	/	19.	" Op. nach Menge. Ovar. r. entfernt.
	73	/	21.	" Keilexc.
	75	/	24.	" "
	76	/	17.	" Keilresect. d. beiden Tuben u. a. beiden Ovar.
	78	/	17.	" Keilexc.
	81	/	17.	" "
	85	/	23.	" "
	86	/	23.	" "
	87	/	18.	" "
	88	/	24.	" " d. Tube r. Adnexe l. entfernt.
	89	/	24.	" " Plastik.
	90	/	16.	" Excisio d. l. Tube Adnexe r. entfernt.
	105	/	26.	" Keilexc.

Operationstag im
1.—4. Tag

Lfd. Nr.	60	/	Post Menstr. Keilexc.
	109	/	4. Tag. Keilexc.

Menstr. nach Sterilisierung ausgeblieben.

Operationstag im

5.—15. Tag des Intervalles.

Lfd Nr.	34 /	9. Tag	Tubenunterbindung	Interpositio	Portio	Amp.	Plastik.
56	/ 15.	"	Keilexc.				
62	/ 9.	"	"	Adnexe r. entfernt.			
71	/ 8.	"	"				
74	/ 13.	"	"				
77	/ 15.	"	"				
79	/ 11.	"	"				
83	/ 12.	"	"	Adnexe l. entfernt.			
91	/ 15.	"	"				
93	/ 6.	"	"				
100	/ 6.	"	"	Interpositio und Plastik.			

2 Fälle im Intervall vom 1—4 Tag = 5,45%

11 " " " " 5—15. " = 29,72%

24 " " " " 15—28. " = 64,83%

37 Fälle. Menstr. nach Sterilisierung ausgeblieben.

Von 122 Sterilisierungen = 30,33%.

Operationstag im
5.—15. Tag des Intervalles.

Lfd. Nr.	50 / 14.	Tag	Tube r. l. u. Ovar. l. entfernt. Keilexc. a. d. Ovar r.
53	/ 7.	"	Keilexc.
56	/ 12.	"	Keilresect. a. beiden Tuben u. a. Ovar. r. Appendectomie.
60	/ 11.	"	Keilexc.
61	/ 11.	"	" Cystenstichelung.
62	/ 10.	"	" Adnexe r. entfernt.
63	/ 11.	"	"
65	/ 5.	"	"
66	/ 6.	"	"
67	/ 6	"	"
69	/ 9.	"	"
71	/ 9	"	"
72	/ 11.	"	"
73	/ 14.	"	"
74	/ 12.	"	"
76	/ 8.	"	"
78	/ 8.	"	"
81	/ 7.	"	"
82	/ 7.	"	"
83	/ 9.	"	"
86	/ 17.	"	" Adnexe r. entfernt.
91	/ 15.	"	"
92	/ 10.	"	"
100	/ 14.	"	"
101	/ 13.	"	"
104	/ 12.	"	"
105	/ 9.	"	" hintere Muttermundslippe amputiert.
106	/ 7.	"	"
107	/ 11.	"	"
108	/ 8.	"	"
109	/ 15.	"	" l. Adnexe r. entfernt

Menstr. nach Sterilisierung zu früh aufgetreten.

Operationstag im
15.—28. Tag des Intervalles.

Lfd. Nr	1	21. Tag	Tube r. Ovar r. Tube l. entfernt.
24	/ 20.	"	Interpositio. Plastik. Tubensterilisierung.
54	/ 16.	"	Keilexc.
55	/ 18.	"	Tube r. Adnexe l. entfernt.
58	/ 22.	"	Corp. lut. r. entfernt.
59	/ 23.	"	Myom entfernt.
64	/ 22.	"	"
68	/ 18.	"	"
70	/ 24.	"	Tuben l. r. u. Ovar l. entfernt.
75	/ 24.	"	Keilexc.
77	/ 16.	"	Adnexe l. r. entfernt. Ovar l. implant.
79	/ 16.	"	Keilexc.
80	/ 17.	"	"
84	/ 21.	"	Tuben l. r. u. Ovar l. entfernt.
85	/ 21.	"	Keilexc.
87	/ 21.	"	"
89	/ 22.	"	"
90	/ 18.	"	per vag.
93	/ 17.	"	"
96	/ 17.	"	Ovar entfernt.
97	/ 16.	"	"
98	/ 24.	"	"
99	/ 18.	"	"
102	/ 23.	"	"
110	/ 20.	"	"

31 Fälle im Intervall vom 5.—15. Tag = 55,36%.

25 " " " " 15.—28. " = 44,64%.

56 Fälle Menstr. nach Sterilisierung zu früh aufgetreten.

Von 122 Sterilisierungen = 45,90%

29 Fälle Menstr. normal eingetreten	= 23,77%
56 " " zu früh "	= 45,90%
37 " " ausgeblieben	= 30,33%
122 Fälle von Sterilisierungen	100,00%.

Operationstag im

5—15. Tag des Intervalles.

Lfd. Nr.	7 / 10.	Tag	Scheiden- u. Damm-Plastik.
	17 / 13.	"	Abrasio. Plastik.
	13 / 14.	"	Plastik. Portio amp.
	39 / 8.	"	" " "

Operationstag im

15.—28. Tag des Intervalles.

Lfd. Nr.	6 / 21.	Tag	Plastik.
	15 / 20.	"	Damm, Sphinct. Plastik.
	12 / 26.	"	Scheiden-Plastik. Portio amp.
	19 / 24.	"	Abrasio. Portio amp.
	24 / 20.	"	Plastik. Dammhämatom entf.
	25 / 19.	"	Scheidencyste entfernt.
	27 / 17.	"	Plastik.
	32 / 27.	"	Schröder Emmet.
	38 / 21.	"	Plastik. Portio amp.
	55 / 21.	"	Portio amp.

10 Fälle im Intervall vom 15.—28. Tag = 71,43 %.

4 " " " " 5.—15. " = 28,57 %.

14 Fälle von 57 Fällen ohne Eröffnung der Bauchhöhle = 24,57 %.

Menstr. zu früh aufgetreten nach Op. ohne Eröffnung der Bauchhöhle.

Operationstag im

5.—15. Tag d. Intervalles.

Lfd. Nr.	6 / 12. Tag	Plastik.	
10 / 12.	"	"	
11 / 13.	"	"	
19 / 15.	"	"	Interpositio.
20 / 10.	"	"	Portio amp.
25 / 9.	"	"	
28 / 10.	"	"	
38 / 12.	"	"	Portio amp.
46 / 15.	"	"	
49 / 14.	"	"	Portio amp.
52 / 13.	"	"	
57 / 15.	"	"	Schroeder-Emmet.

Operationstag im

15.—28. Tag d. Intervalles.

Lfd. Nr.	2 / 26. Tag	Plastik.	
5 / 20	"	"	Portio Plastik.
8 / 22.	"	"	"
32 / 18.	"	"	Portio amp.
36 / 18.	"	"	Schroeder-Emmet.
42 / 20.	"	"	Plastik. Portio amp.
44 / 19.	"	"	" " Vaginifixur.
88 / 20.	"	"	
94 / 22.	"	"	Portio amp.
95 / 20.	"	"	

12 Fälle im Intervall vom 5.—15. Tag = 54,55%

10 " " " " 15.—28. " = 45,45%

22 Fälle Menstr. zu früh aufgetreten nach Op. ohne Eröffnung
der Bauchhöhle.

Normale Menstr. ausgeblieben nach Operation ohne Eröffnung der Bauchhöhle.

Operationstag im

5.—15. Tag d. Intervalles.

Lfd. Nr.	3 / 7. Tag	Plastik.
23 / 12.	„	„ Amp. d. Muttermundslippe. keilförmig.
29 / 10.	„	Myom entfernt.
30 / 12.	„	Portio amp.
39 / 10.	„	Plastik Portio amp.
50 / 15.	„	„
61 / 13.	„	„
72 / 12.	„	Fistelop.
103 / 8.	„	Plastik.
107 / 10.	„	Portio amp.

Operationstag im

15.—28. Tag d. Intervalles.

Lfd. Nr.	10 / 20. Tag	Plastik.
17 / 28.	„	„ Portio amp.
18 / 17.	„	„ Collum amp.
46 / 17.	„	„
27 / 21.	„	Portio amp.
28 / 20.	„	„ „ Plastik.
51 / 20.	„	„ „
55 / 17.	„	„ „ Plastik.
82 / 17.	„	Plastik.
96 / 19.	„	„
108 / 17.	„	Myom entfernt.

10 Fälle im Intervall vom 5.—15. Tag = 47,62%.

11 „ „ „ „ 15.—28. „ = 52,38%.

21 Fälle. Normale Menstr. ausgeblieben.

14 Fälle Menstr. normal eingetreten = 24,57%

22 „ „ zu früh „ = 38,59%

21 „ „ ausgeblieben = 36,84%

57 Fälle von Op. ohne Eröffnung der Bauchhöhle.

Normale Menstruation nach einseitiger Adnex-Entfernung.

Operationstag im 15.—28. Tag des Intervalles.

Lfd. Nr. 9 / 18. Tag Adnexe l. entfernt

10 / 28. " " r. "

21 / 26. " " l. "

3 Fälle im Intervall vom 15.—28. Tag = 100 %. Menstr. normal nach einseitiger Adnex-Entfernung.

Menstr. zu früh eingetreten nach einseitiger Adnex-Entfernung.

Operationstag im 5.—15. Tag des Intervalles.

Lfd. Nr. 18 / 15. Tag Adnexe r. entfernt

Operationstag im 15.—28. Tag des Intervalles.

Lfd. Nr. 23 / 18. Tag Adnexe l. entfernt

26 / 24. " " r. "

39 / 24. " " l. "

1 Fall im Intervall vom 5.—15. Tag = 25 %.

3 Fälle " " " 15.—28. " = 75 %.

4 Fälle Menstr. zu früh eingetreten nach einseitiger Adnex-Entfernung.

Menstr. ausgeblieben nach einseitiger Adnex-Entfernung.

Operationstag im 1.—4. Tag des Intervalles.

Lfd. Nr. 59 / 3. Tag Adnexe entfernt. r.

Operationstag im 5.—15. Tag des Intervalles.

Lfd. Nr. 5 / 14. Tag Adnexe l. entfernt

13 / 14. " " l. "

1 Fall im Intervall vom 1.—4. Tag = 25 %.

2 Fälle " " " 5.—15. " = 75 %.

3 Fälle Menstr. ausgeblieben nach einseitiger Adnex-Entfernung.

3 Fälle Menstr. normal eingetreten = 30,00 %.

4 " " zu früh " = 40,00 %.

3 " " ausgeblieben = 30,00 %.

10 Fälle einseitiger Adnex-Entfernung.

Normale Menstr. nach einseitiger Adnex-Entfernung in Verbindung mit
anderen Operationen.

Operationstag im 15.—28. Tag des Intervalles.

Lfd. Nr.	5 / 24.	Tag	Adnexe r. entfernt.	Blinddarm entfernt.	Teilresect. d. l. Ovar.
16 / 26.	"		Adnexe l. entfernt.	Teilresect. r. Ovar.	
22 / 20.	"		" r. "	Tube l. entfernt.	Keilresect. l. Ovar.
35 / 24.	"		" l. "	Sterilisierung.	
45 / 26.	"		" r. "	Keilresect. Tube l.	
62 / 29.	"		" l. "	" " r. Myom entfernt.	

6 Fälle im Intervall vom 15. - 28. Tag = 100 %.

Menstr. zu früh eingetreten nach einseitiger Adnex-Entfernung in Verbindung
mit anderen Operationen.

Operationstag im 5.—15. Tag des Intervalles.

Lfd. Nr.	50 / 14.	Tag	Adnexe l. Tube l. entfernt.	Keilexc. a. d. r. Ovar.
109 / 15.	"		" r. entfernt.	Keilexc. d. Tube l.

Operationstag im 15.—28. des Intervalles.

Lfd. Nr.	4 / 19.	Tag	Adnexe l. entfernt.	Resect. l. Ovar.	Blinddarm entfernt.
37 / 23.	"		" r. "	Dolérís.	
55 / 18.	"		" l. "	Keilexc. Tube r.	
70 / 24.	"		" l. "	Tube r. entfernt.	
84 / 21.	"		" l. "	" r. "	
86 / 17.	"		" r. "	Keilexc. Tube l.	

2 Fälle im Intervall vom 5.—15. Tag = 25 %.

6 " " " " 15.—28. " = 75 %.

} 8 Fälle Menstr. nach einseitiger
Adnex-Entfernung in Verbin-
mit anderen Operationen - zu
früh eingetreten.

Normale Menstr. ausgeblieben nach einseitiger Adnex-Entfernung in Verbindung mit anderen Operationen.

Operationstag im 5.—15. Tag des Intervalles.

Lfd Nr.	Tag	Adnexe entfernt	r. Blinddarm entfernt.
48 / 15.	Tag	Adnexe entfernt	r. Blinddarm entfernt.
53 / 13.	"	"	l. " "
62 / 9.	"	"	r. Keilexc. l.
83 / 12.	"	"	l. " r.
107 / 10.	"	"	r. Doléris.

Operationstag im 15.—28 Tag des Intervalles.

Lfd Nr.	Tag	Adnexe l. entfernt.	Blinddarm entfernt.
9 / 26.	Tag	Adnexe l. entfernt.	Blinddarm entfernt.
40 / 23.	"	l. " Myom	"
44 / 26.	"	r. " "	"
84 / 17.	"	r. " Cyste	"
88 / 24.	"	l. " Keilexc. r.	
90 / 16.	"	r. " Tube l. entfernt.	
101 / 19.	"	r. " Myom entfernt. Portio amp.	

5 Fälle im Intervall vom 5.—15. Tag = 41,67 %.

7 " " " " 15.—28. " = 58,33 %.

12 Fälle Menstr. ausgeblieben nach einseitiger Adnex-Entfernung in Verbindung mit anderen Operationen.

6 Fälle Menstr. normal eingetreten == 23,08 %.

8 " " zu früh " = 30,77 %.

12 " " ausgeblieben = 46,15 %.

26 Fälle einseitiger Adnex-Entfernung in Verbindung mit anderen Operationen.

Menstr. normal eingetreten nach einseitiger Ovar.-Operation.

Operationstag im 15.—28. Tag des Intervalles.

Lfd. Nr. 1 / 23. Tag Follikel Cyste exc.
2 / 27. " Ovarcyste r. "

2 Fälle, im Intervall vom 15.—28. Tag = 100 %. Menstr. normal eingetreten nach einseitiger Ovar.-Operation.

Normale Menstr. ausgeblieben nach einseitiger Ovar.-Operation.

Operationstag im 15.—28. Tag des Intervalles.

Lfd. Nr. 2 / 16. Tag Ovarcyste l. exc.

1 Fall, im Intervall vom 15.—28. Tag = 100 %. Normale Menstr. ausgeblieben nach einseitiger Ovar.-Op.

Menstr. zu früh eingetreten nach einseitiger Ovar.-Op.

Operationstag im 15.—28. Tag des Intervalles.

Lfd. Nr. 1 / 21. Tag Ovarcyste r. exc.
45 / 18. " " l. "

2 Fälle, im Intervall vom 15.—28. Tag = 100 %. Menstr. zu früh eingetreten nach einseitiger Ovar.-Op.

2 Fälle Menstr. normal eingetreten = 40,00 %.

1 Fall " ausgeblieben = 20,00 %.

2 Fälle " zu früh eingetreten = 40,00 %.

5 Fälle einseitiger Ovar.-Operation.

Einseitige Ovar.-Op. in Verbindung mit anderen Operationen.
Menstr. normal eingetreten.

Operationstag im 5.—15. Tag des Intervalles.

Lfd. Nr. 57 / 13. Tag Ovarcyste l. entfernt. Tube l. entfernt Blinddarm entfernt.

1 Fall im Intervall vom 5 —15. Tag = 100 %.

Normale Menstr. ausgeblieben nach einseitiger Ovar.-Operat. in Verbindung
mit anderen Operationen.

Operationstag im 5.—15. Tag des Intervalles.

Lfd. Nr.	24 / 9. Tag	Keilres. d. r. Ovar. Tube r. entf. Blinddarm entf.
	33 / 6. "	" r. Ovar. Tube r. entfernt.
	37 / 14. "	Ovarcyste l. Tube l. u. Blinddarm entfernt. Doléris.
	102 / 11. "	Keilexc. a. d. r. Ovar. Doléris. Blinddarm entfernt.

Operationstag im 15.—28. Tag des Intervalles.

Lfd. Nr.	15 / 19. Tag	Keilexc. a. d. r. Ovar. Doléris
	84 / 17. "	Ovarcyste u. Adnexe r. entfernt.
	8 / 18. "	Ovarresect. Doléris.

4 Fälle im Intervall vom 5.—15. Tag = 57,14 %.

3 " " " 15.—28. " = 42,86 %.

7 Fälle Menstr. ausgeblieben nach einseitiger Ovar.-Operation in Verbindung mit anderen Operationen.

Menstr. zu früh eingetreten nach einseitiger Ovar.-Operation in Verbindung
mit anderen Operationen.

Operationstag im 5.—15. Tag des Intervalles.

Lfd. Nr.	56 / 12. Tag	Keilresect. Ovar. r. Tube l. r. u. Blinddarm entfernt.
----------	--------------	--

Operationstag im 15.—28. Tag des Intervalles.

Lfd. Nr.	27 / 20. Tag	Ovarcyste l. Keilresect. Doléris.
	34 / 19. "	Cyste l. Tube l. u. Blinddarm entfernt.
	58 / 22. "	Corp. lut. r. entfernt. Keilexc. d. Tuben.

1 Fall im Intervall vom 5.—15. Tag = 25,00 %.

3 Fälle " " 15.—28. " = 75,00 %.

4 Fälle Menstr. zu früh eingetreten nach einseitiger Ovar.-Operation in Verbindung mit anderen Operationen.

1 Fall Menstr. normal eingetreten = 8,34 %.

4 Fälle " zu früh " = 33,33 %.

7 " " ausgeblieben = 58,33 %.

12 Fälle einseitiger Ovar.-Operationen in Verbindung mit anderen Operationen

Norm. Menstr. ausgeblieben nach einseitiger Ovar.-Entfernung.

Operationstag im 5.—15. Tag des Intervalles.

Lfd. Nr. 32 / 10. Tag Ovar. l. entfernt
14 / 9. " " l. "

2 Fälle im Intervall vom 5.—15. Tag.

Menstr. normal eingetreten nach einseitiger Ovar.-Entfernung: kein Fall.

Menstr. zu früh eingetreten nach einseitiger Ovar.-Entfernung: kein Fall.

Normale Menstr. ausgeblieben nach einseitiger Ovar.-Entfernung in Verbindung
mit anderen Operationen . . .
ausgenommen Adnexentfernung. 4 Fälle.

Operationstag im 5.—15. Tag des Intervalles.

Lfd. Nr. 25 / 12. Tag Ovar r. entfernt. Keilexc. Ovar. l.

Operationstag im 15.—28. Tag des Intervalles.

Lfd. Nr. 8 / 18. Tag Ovar. r. entfernt. Doléris.
25 / 22. " " l. " " Plastik. Herniot.
70 / 19. " " r. " Menge.

1 Fall im Intervall vom 5.—15. Tag = 25,00 %.

3 Fälle " " " 15.—28. " = 75,00 %.

4 Fälle.

Menstr. zu früh eingetreten nach einseitiger Ovar.-Entfernung in Verbindung
mit anderen Operationen . . .
ausgenommen Adnexentfernung. Kein Fall.

Menstr. normal eingetreten nach einseitiger Ovar.-Entfernung in Verbindung
mit anderen Operationen . . .
ausgenommen Adnexentfernung. Kein Fall.

Doppelseitige Ovar.-Operation in Verbindung mit anderen Operationen.
Menstr. normal eingetreten.

Operationstag im 15.—28. Tag des Intervalles.

Lfd. Nr. 14 / 28 Tag Keilresect. l. Ovar tumor r. u. Blinddarm entfernt.
29 / 27. " " a. beiden Ov. Blinddarm entf. Doléris.
30 / Prae Menstr. Keilresect. a. beiden Ov. Keilexc. d. l. r. Tuben.

3 Fälle nach doppelseitiger Ovar.-Op. in Verbindung mit anderen Operat.
Menstr. normal eingetreten.

Normale Menstr. ausgeblieben nach doppelseitiger Ovar.-Oper. in Verbindung
mit anderen Operationen.

Operationstag im 15.—28. Tag des Intervalles.

Lfd. Nr. 76 / 17. Tag Keilexc. a. beiden Ov. u. aus beiden Tuben.

1 Fall, Normale Menstr. ausgeblieben nach doppelseitiger Ovar.-Op. in
Verbindung mit anderen Operationen.

Menstr. zu früh eingetreten nach doppelseitiger Ovar.-Oper. in Verbindung
mit anderen Operationen.

Operationstag im 15.—28. Tag des Intervalles.

Lfd. Nr. 3 / 16. Tag Dermoidexstirp. l. Ovar. r. u. Tube r. resec.

3 Fälle Menstr. normal eingetreten = 60,00 %.

1 Fall " zu früh " = 20,00 %.

1 " " ausgeblieben = 20,00 %.

5 Fälle, nach doppelseitiger Ovar.-Op. in Verbindung mit anderen Operat.

Normale Menstr. ausgeblieben nach doppelseitiger Ovar.-Entfernung.
1 Fall.

Operationstag im 15.—28. Tag des Intervalles.

Lfd. Nr. 110 / 18. Tag Ovar. r. l. entfernt.

Menstr. zu früh eingetreten nach doppelseitiger Ovar.-Entfernung.
1 Fall.

Operationstag im 15.—28. Tag des Intervalles.

Lfd. Nr. 77 / 16. Tag Beide Adnexe entfernt. Ovar l. implantiert.

2 Fälle nach doppelseitiger Ovar.-Entfernung.

Menstr. normal eingetreten nach Operationen am Uterus.

Operationstag im 5.—15. Tag des Intervalles.

Lfd. Nr. 46 / 12. Tag Doléris.

Operationstag im 15.—28. Tag des Intervalles

Lfd. Nr. 26 / 26. Tag Doléris.

2 Fälle Menstr. normal eingetreten nach Operationen am Uterus.

Normale Menstr. ausgeblieben nach Operationen am Uterus.

Operationstag im 5.—15. Tag des Intervalles.

Lfd. Nr. 41 / 12. Tag Doléris.

92 / 12. " "

94 / 13. " "

Operationstag im 15.—28. Tag des Intervalles.

Lfd. Nr. 35 / 18. Tag Doléris.

47 / 21. " " Myom entfernt u. Portio amp.

49 / 17. " " Portio amp.

3 Fälle im Intervall vom 5.—15. Tag = 50,00 %.

3 " " " " 15.—28. " = 50,00 %.

6 Fälle normale Menstr. ausgeblieben.

Menstr. zu früh eingetreten nach Operationen am Uterus.

Operationstag im 5.—15. Tag des Intervalles.

Lfd. Nr. 15 / 11. Tag Myom entfernt.

51 / 12. " " " Doléris.

Operationstag im 15.—28. Tag des Intervalles.

Lfd. Nr. 7 / 17. Tag Doléris.

9 / 16. " "

13 / 20. " "

14 / 20. " "

16 / 20. " "

29 / 17. " "

47 / 20. " "

2 Fälle im Intervall vom 5.—15. Tag = 22,23 %.

7 " " " " 15.—28. " = 77,77 %

9 Fälle Menstr. zu früh eingetreten nach Uterus-Op.

2 Fälle Menstr. normal eingetreten = 11,77 %.

9 " " zu früh " = 52,94 %.

6 " " ausgeblieben = 35,29 %.

17 Fälle von Uterus-Operationen.

Menstr. normal eingetreten nach Uterus-Operationen in Verbindung mit anderen Operationen.

Operationstag im 5.—15. Tag des Intervalles.

Lfd. Nr. 2 / 10. Tag Plastik. Portio amp Alexander Adam.

Operationstag im 15.—28. Tag des Intervalles.

Lfd. Nr. 3 / 25. Tag Doléris. Plastik.

4 / 16.	"	"	"	
20 / 25.	"	"	Blinddarm entfernt.	
23 / 25.	"	Myom u.	"	"
29 / 27.	"	Doléris	"	Ovar. l. Keilr.
59 / 30.	"	"	Plastik.	

1 Fall im Intervall vom 5.—15. Tag = 14,29 %.

6 Fälle „ „ „ 15.—28. „ = 85,71 %.

7 Fälle Menstr. normal eingetreten nach Uterus-Operationen in Verbindung mit anderen Operationen.

Normale Menstr. ausgeblieben nach Uterus-Operation in Verbindung mit anderen Operationen.

Operationstag im 5.—15. Tag des Intervalles.

Lfd. Nr. 4 / 8. Tag Doléris. Plastik.

20 / 11.	"	"	"	
31 / 10.	"	"	Blinddarm entfernt.	
37 / 14.	"	"	"	Tube l. u. Ovarcyste l. entf.
43 / 12.	"	"	Plastik. Portio amp.	
102 / 11.	"	"	Ovar. r. Keilexc. Blinddarm entfernt.	
107 / 10.	"	"	Adnexe r. entfernt.	
83 / 12.	"	"	Plastik. Interpositio.	

Operationstag im 15.—28. Tag des Intervalles.

Lfd. Nr. 8 / 18. Tag Doléris. Ovar resect. r.

9 / 26.	"	"	Adnexe l. entfernt. Blinddarm entfernt.	
11 / 24.	"	"	Plastik.	
15 / 19.	"	"	Keilexc. a. dem r. Ovar.	
21 / 23.	"	Alexander Adam.	Portio amp. Herniotomie.	
25 / 22.	"	Doléris.	Ovar. l. entfernt.	Plastik.
70 / 19.	"	Menge.	Ovar. r. entfernt.	
98 / 24.	"	Doléris.	Plastik.	
101 / 19.	"	Adnexe r. u. Myom	entfernt Portio amp.	
45 / 27.	"	"	Plastik. Interpositio.	

8 Fälle im Intervall vom 5.—15. Tag = 44,44 %.

10 „ „ „ „ 15.—28. „ = 55,56 %.

18 Fälle Normale Menstr. ausgeblieben nach Uterus-Operat. in Verbindung mit anderen Operationen.

Menstr. zu früh eingetreten nach Uterus-Operationen in Verbindung
mit anderen Operationen.

Operationstag im

1.—4. Tag des Intervalles.

Lfd. Nr. 43 / 2. Tag Doléris. Plastik. Portio amp.

Operationstag im

5.—15. Tag des Intervalles.

Lfd. Nr. 30 / 10. Tag Doléris. Plastik. Portio amp.

33 / 9. " " "

40 / 8. " " "

41 / 12. " Alexander Adam. Plastik.

51 / 12. " Doléris. Myom entfernt.

17 / 13. " Plastik. Portio amp. Interpositio.

Operationstag im

15.—28. Tag des Intervalles.

Lfd. Nr. 24 / 20. Tag Interpositio. Portio Plastik. Sterilisierung.

27 / 20. " Doléris. Ovarcyste l. resec.

31 / 16. " " Herniotom. Blinddarm entfernt.

35 / 19. " Alexander Adam. Herniotomie.

37 / 23. " Doléris. Adnexe r. entfernt.

12 / 24. " Plastik. Interpositio.

1 Fall im Intervall vom 1—4. Tag = 7,70 %

6 Fälle " " " 5—15. " = 46,15 %

6 " " " " 15—28. " = 46,15 %

13 Fälle Menstr. zu früh eingetreten nach Uterus-Operat. in Verbindung
mit anderen Operationen.

7 Fälle Menstr. normal eingetreten = 18,42 %

13 " " zu früh " = 34,21 %

18 " " ausgeblieben = 47,37 %

38 Fälle von Uterus-Operationen in Verbindung mit anderen Operationen.

Zusammenfassend habe ich also gefunden: von 283 Fällen waren in 63 Fällen die Menstruation normal eingetreten; in 110 Fällen war die Menstruation zu früh aufgetreten und in 110 Fällen die Menstruation ausgeblieben.

Von 122 Fällen von Sterilisierung war die Menstruation in 29 Fällen normal, in 56 Fällen zu früh, in 37 Fällen ausgeblieben.

In 57 Fällen von Operationen ohne Eröffnung der Bauchhöhle war die Menstruation in 14 Fällen normal, in 22 Fällen zu früh und in 21 Fällen ausgeblieben.

In 10 Fällen einseitiger Adnexentfernung war die Menstruation in 3 Fällen normal, in 4 Fällen zu früh und in 3 Fällen ausgeblieben.

In 26 Fällen einseitiger Adnexentfernung in Verbindung mit anderen Operationen war in 6 Fällen die Menstruation normal, in 8 Fällen zu früh und in 12 Fällen ausgeblieben.

In 5 Fällen einseitiger Ovaroperation war die Menstruation in 2 Fällen normal, in 2 Fällen zu früh und in 1 Falle ausgeblieben.

In 12 Fällen einseitiger Ovaroperation in Verbindung mit anderen Operationen war in 1 Falle die Menstruation normal, in 4 Fällen zu früh und in 7 Fällen ausgeblieben.

In 2 Fällen einseitiger Ovarentfernung war die Menstruation in 2 Fällen normal.

In 4 Fällen einseitiger Ovarentfernung in Verbindung mit anderen Operationen war die Menstruation ausgeblieben.

In 5 Fällen doppelseitiger Ovaroperation in Verbindung mit anderen Operationen war die Menstruation in 3 Fällen normal, und in je einem Falle zu früh und ausgeblieben.

In 2 Fällen doppelseitiger Ovarentfernung war die Menstruation in 1 Falle zu früh und im 2. Falle ausgeblieben.

In 17 Fällen von Uterusoperationen war die Menstruation in 2 Fällen normal, in 9 Fällen zu früh und in 6 Fällen ausgeblieben.

In 38 Fällen von Uterusoperationen in Verbindung mit anderen Operationen war die Menstruation in 7 Fällen normal, in 13 Fällen zu früh und in 18 Fällen ausgeblieben.

Auch ich schließe mich der Meinung anderer Autoren an, die annehmen, daß die Operation schockartig auf das endokrine System einwirkt, ohne daß ein gesetzlicher Einfluß auf das Verhalten der Menstruation ausgeübt wird.

Herrn Prof. Dr. Haupt, früher Bonn, jetzt Jena, danke ich für die freundliche Überlassung des Themas. Ebenso möchte ich an dieser Stelle Herrn Prof. Dr. Siebke für seine Hilfsbereitschaft und für die Übernahme des Korreferats danken, wie auch Herrn Prof. Dr. Rupp für die Übernahme des Referats.

Lebenslauf.

Ich, Kurt Stern, bin am 28. Aug. 1899 als Sohn des Kaufmannes Albert Stern, zu Dortmund geboren. Dort besuchte ich die Volksschule und das Realgymnasium. Vom Jahre 1917 bis zum Jahre 1919 war ich Soldat. An der Westfront 1918 bin ich verwundet worden. Ich erhielt das Eiserne Kreuz II., das Verwundeten-Abzeichen und das Ehrenkreuz für Frontkämpfer. Ende 1919 bestand ich das Kriegsabitur am Realgymnasium zu Dortmund. Darauf studierte ich einige Semester Medizin. Wegen äußerer Verhältnisse mußte ich das Studium unterbrechen und studierte dann 1930 Medizin zu Bonn. Hier bestand ich 1933 das Physikum und am 5. April 1937 das Staatsexamen mit „Gut“.
